

I. ESTADO DE SALUD

1 Estado de salud percibido

Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades Intervención
- Prioridades Investigación

Índice de tablas

Tabla 1.1a. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 1.1b. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 1.2a. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

Tabla 1.2b. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Tabla 1.2c. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Tabla 1.2d. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.

Tabla 1.3a. Estado de salud percibido. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Tabla 1.3b Estado de salud percibido. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Tabla 1.3c Estado de salud percibido. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

1.1 Introducción

En las encuestas de salud se suele incluir una pregunta general en la que se le pide a la persona entrevistada que explique cómo percibe su propio estado de salud. En el caso de la Encuesta Nacional de Salud 2006 y de la Encuesta de Salud a Población Gitana 2006 la pregunta era:

“En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?”

A pesar de la aparente simplicidad de una pregunta como esta, la respuesta aporta una información de gran valor epidemiológico. Las personas que responden que su estado de salud es muy bueno o bueno son también las personas que menos utilizan los servicios de salud, acumulan menos problemas de salud (tanto cuando ellos mismos relatan los problemas de salud que padecen, como cuando quien realiza el examen de salud es personal sanitario) y, quizá esto sea lo más interesante, son también las personas que menos probabilidad de fallecer tienen en los próximos años.

La relación entre la respuesta positiva o negativa a esta pregunta y la probabilidad de fallecer fue expuesta por primera vez de forma confiable por Mossey y Shapiro en 1982, a partir de un estudio longitudinal en Manitoba (Cánada)¹². Posteriormente, se han ido sucediendo diferentes réplicas de este estudio en diferentes países y con diferentes grupos sociales¹³. En ellos se encuentra una mayor probabilidad de fallecer entre aquellos que cuentan con una peor auto-percepción de su estado de salud, tanto en mujeres como en hombres, en los diferentes niveles socioeconómicos, para las diferentes edades, en diferentes países y para diferentes grupos étnicos^{14,15}.

El estado de salud percibido está asociado con diferentes aspectos de la posición social como son el nivel educativo, el grupo socioeconómico o el grupo étnico de pertenencia. Cuando peor es la posición social más probable es que se describa el propio estado de salud como malo o muy malo y, al mismo tiempo, también es más probable contar con elevadas tasas de mortalidad para diferentes causas de fallecimiento¹⁶.

En cualquier caso, puesto que cada persona y grupo social tiene conceptos de salud diferenciados, un indicador subjetivo de este tipo puede variar según las percepciones de la salud y por tanto se debe ser prudente a la hora de realizar comparaciones directas entre grupos sociales con diferente situación socioeconómica o con componentes culturales distintos. Se trata de

¹² Mossey, JM., Shapiro, E. (1982) *Self-rated health: a predictor of mortality among the elderly*. *American Journal of Public Health*, 72, 8: 800-8.

¹³ Idler, EL., Benyamini, Y. (1997) *Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies*. *Journal of Health and Social Behavior*, 38, 1: 21-37.

¹⁴ Burström, B., Fredlund, P. (2001) *Self rated health: is it as good a predictor of subsequent mortality among adults in coger as well as in higher social classes?*. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 55, 11: 836-40.

¹⁵ Dowd, JB., Zajacova, A. (2007) *Does the predictive power of self-rated health for subsequent mortality risk vary by socioeconomic status in the US?*. *International Journal of Epidemiology*, 36, 6: 1214-21.

¹⁶ Mackenbach, Johan P., Stirbu, Irina; Roskam, Albert-Jan R., Schaap, Maartje M., Menvielle, Gwenn; Leinsalu, Mall; Kunst, Anton E. (2008) *Socioeconomic inequalities in health in 22 European Countries*. *The New England Journal of Medicine*, 358, 23: 2468-2481.

un indicador dependiente tanto del estado de salud como de las percepciones sobre el estado de salud¹⁷.

1.2 Resultados detallados

La comparación directa, sin ajustar por edad, de las respuestas sobre el estado de salud de la población gitana y la población general de España produce como resultado aparente que el estado de salud percibido de la población gitana mayor de 16 años es similar al de la población general de España de esa edad, sin embargo, como se observa en las tablas por grupos de edad y sexo que se exponen más adelante, esta información está confundida por el hecho de que la población gitana es más joven.

Tabla 1.1a. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (muy bueno/bueno vs regular/malo/muy malo)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo?						
		Muy bueno/bueno	Regular/malo/muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)
Hombres	Clase I	86,0	14,0	32,4	53,6	10,4	2,0	1,6	100	1104
	Clase II	79,3	20,7	22,9	56,3	13,3	5,0	2,4	100	1145
	Clase III	74,4	25,6	20,7	53,7	19,7	4,4	1,4	100	2967
	Clase IVa	70,0	30,0	18,2	51,7	22,9	5,2	1,9	100	3369
	Clase IVb	67,5	32,5	18,6	48,9	25,7	5,0	1,8	100	1445
	Clase V	63,9	36,1	13,3	50,6	26,2	7,2	2,8	100	1466
	No consta	74,9	25,1	23,1	51,8	15,0	9,0	1,2	100	149
	Población General	72,6	27,4	20,3	52,4	20,5	5,0	1,9	100	11645
	Población Gitana (IC95%)	71,9 (67,6-75,9)	28,1 (24,1-32,4)	22,6	49,3	20,7	6,0	1,4	100	463
Mujeres	Clase I	75,6	24,4	22,5	53,1	19,9	2,7	1,8	100	1509
	Clase II	69,5	30,5	19,4	50,1	24,4	4,5	1,6	100	1722
	Clase III	62,8	37,2	16,5	46,2	27,3	7,3	2,6	100	4445
	Clase IVa	57,2	42,8	14,2	43,0	32,1	8,1	2,5	100	4610
	Clase IVb	56,3	43,7	14,2	42,1	31,5	8,6	3,6	100	2507
	Clase V	53,7	46,3	12,9	40,8	31,2	11,6	3,5	100	2532
	No consta	53,8	46,2	12,4	41,5	31,6	10,6	4,0	100	508
	Población General	60,6	39,4	15,8	44,9	28,9	7,7	2,7	100	17833
	Población Gitana (IC95%)	58,6 (54,3-62,7)	41,4 (37,3-45,7)	19,4	39,2	30,7	7,8	2,9	100	527

En el caso de las personas de 15 ó menos años también se observa una valoración similar en población gitana y en la población general de España en el caso de los niños y las niñas.

¹⁷ Por ejemplo, en la monografía *Salud y Comunidad Gitana del Ministerio de Sanidad y Consumo (2005)*, siguiendo las aportaciones de David Lagunas Arias, en su artículo "Resolviendo la salud. Los gitanos catalanes". *Gazeta de Antropología*. 1999, 15: 12-15, se apunta lo siguiente "Un gran porcentaje de los gitanos y las gitanas conciben la salud como ausencia de enfermedad, y la enfermedad como una situación invalidante ligada a la muerte. Esta determinada visión de la salud y la enfermedad tiene varias consecuencias: la preocupación por la salud comienza cuando aparecen síntomas y consecuencias muy llamativas e invalidantes, por lo que el concepto de prevención es difícil de trabajar. Una vez que la persona (y su entorno familiar) perciben que ha aparecido la enfermedad, la actuación debe ser inmediata y resolutive, por la relación directa que establecen entre enfermedad y muerte." Si esta afirmación es válida las pautas de respuesta a la pregunta sobre salud percibida en la población gitana, ante un problema leve de salud serán más optimistas en la población gitana que en el resto de la población, lo que implicaría a la luz de los datos aquí expuestos que el estado de salud de la comunidad gitana es mucho peor que el de la población general. Ministerio de Sanidad (2005). *Salud y Comunidad Gitana*. Madrid: Dirección General de Salud Pública y Fundación Secretariado Gitano.

Tabla 1.1b. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)						
		Muy bueno, bueno	Regular, malo, muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	92,5	7,5	48,6	43,9	6,9	,2	,4	100	513
	Clase II	90,3	9,7	42,0	48,3	8,7	,6	,3	100	513
	Clase III	88,5	11,5	40,9	47,6	10,2	,9	,4	100	1060
	Clase IVa	85,7	14,3	35,7	50,1	12,3	1,6	,4	100	1333
	Clase IVb	86,1	13,9	35,1	51,0	11,4	2,3	,3	100	603
	Clase V	85,7	14,3	32,6	53,0	12,0	1,6	,7	100	543
	No consta	93,4	6,6	32,0	61,4	6,6	,0	,0	100	51
	Población General	87,9	12,1	38,7	49,2	10,5	1,2	,4	100	4616
	Población Gitana (IC95%)	88,3 (83,7-91,6)	11,7 (8,0-15,9)	38,4	49,9	8,9	2,5	,4	100	264
Niñas	Clase I	90,3	9,7	47,0	43,3	8,0	,9	,8	100	508
	Clase II	91,8	8,2	45,6	46,2	7,9	,0	,3	100	502
	Clase III	91,8	8,2	42,4	49,4	7,5	,3	,4	100	1053
	Clase IVa	90,1	9,9	38,6	51,5	8,9	,8	,2	100	1290
	Clase IVb	84,0	16,0	37,7	46,3	12,6	1,7	1,7	100	568
	Clase V	87,1	12,9	38,1	48,9	11,5	1,0	,5	100	528
	No consta	91,8	8,2	39,5	52,3	8,1	,1	,0	100	57
	Población General	89,6	10,4	41,2	48,4	9,1	,7	,6	100	4506
	Población Gitana (IC95%)	86,0 (81,3-90,2)	14,0 (9,8-18,7)	37,0	49,0	11,5	1,2	1,3	100	239

Resumen

- Las mujeres gitanas (adultas) tienen peor valoración de su estado de salud que la población masculina gitana. Un 14% de las niñas señala tener mala salud, frente al 11,7% de los niños, sin llegar a ser una diferencia significativa. En la población gitana adulta un 41,4% de las mujeres indica tener mala salud, frente a un 28,1% en los hombres.
- La comparación de las respuestas sobre el estado de salud percibido en la población gitana y la población general de España debe controlarse por la variable edad debido a la diferencia en la estructura de edad y sexo entre ambas poblaciones.

Cuando se analiza el estado de salud por grupos de edad se observa, para el caso de los hombres, que la percepción sobre la propia salud es similar en los niños, adolescentes y en los menores de 35 años. A partir de esa edad sin embargo, la población gitana masculina presenta un mayor porcentaje de personas que definen su estado de salud como malo o muy malo. Es en las edades más avanzadas donde se encuentra la mayor distancia entre la población gitana y la población general. En los hombres mayores de 55 años un 33,4% de los gitanos describe su salud como buena o muy buena, frente al 52,3% de la población general de España.

En las mujeres gitanas se observa de igual modo una valoración más negativa del propio estado de salud a partir de los 35 años y también antes de los 4 años que en la población general. En las mujeres mayores de 55 años un 10,2% de las gitanas describe su salud como buena o muy buena, frente al 38,5% en la población general de España.

Resumen

- *La valoración del estado de salud percibido en la población gitana es peor que en la población general de España en los grupos de más edad (a partir de los 35 años) en ambos sexos.*
- *En los hombres mayores de 55 años un 33,4% de los gitanos describe su salud como buena o muy buena, frente al 52,3% de la población general. En las mujeres mayores de 55 años el porcentaje desciende a 10,2% en las mujeres gitanas y a 38,5% en las mujeres de la población general.*
- *La valoración del estado de salud percibido empeora de forma más acentuada conforme aumenta la edad en la población gitana que en la población general de España.*

Es relevante señalar que la valoración del estado de salud en la población general de España sigue un gradiente en función de la clase social ocupacional de la persona de referencia en el hogar en las personas adultas. Como se ha explicado en la introducción de este informe, la escala de clase social ocupacional discurre entre los cuadros directivos y las ocupaciones asociadas a titulaciones universitarias de ciclo largo, la llamada clase social I, hasta los trabajos manuales que no requieren cualificación: la clase social V.

Cuando mejor es la posición socioeconómica mejor es la valoración del estado de salud, en todos los grupos de edad y sexo en personas adultas. En este sentido, cabría esperar que por su situación social en España la población gitana se situase en los extremos de valoración negativa en todos los grupos de edad y sexo. Como se observa en los resultados de la población gitana adulta la valoración de su estado de salud es similar a la que realizan las clases sociales IV y V. Excepto entre las mujeres gitanas mayores de 55 años que es incluso peor.

Tabla 1.2a. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)						
		□□□□□□ □□□□□□ □□	□□□□- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□	□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□ □□□□□	□□□□□□	
		%	%	%	%	%	%	%	%	□□□□□□□□□□- □□□□□□□□□□
De 16 a 24 años	Clase I	96,1	3,9	48,4	47,6	3,9	,0	,0	100	88
	Clase II	94,5	5,5	34,6	59,9	5,2	,3	,0	100	117
	Clase III	93,0	7,0	36,9	56,1	6,7	,3	,0	100	226
	Clase IVa	93,1	6,9	37,9	55,2	6,8	,1	,0	100	321
	Clase IVb	81,9	18,1	32,9	49,1	16,6	1,5	,0	100	121
	Clase V	84,6	15,4	21,1	63,5	12,3	1,6	1,5	100	151
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	Población General	91,3	8,7	36,0	55,3	7,9	,5	,2	100	1048
	Población Gitana (IC95%)	90,8 (85,0-94,5)	9,2 (5,5-15,0)	35,7	55,1	8,6	,6	,0	100	149
De 25 a 34 años	Clase I	94,1	5,9	40,7	53,3	4,1	,7	1,1	100	176
	Clase II	91,1	8,9	27,9	63,2	6,4	1,6	,9	100	192
	Clase III	86,1	13,9	31,2	54,9	12,1	1,1	,7	100	362
	Clase IVa	84,0	16,0	27,5	56,4	13,9	1,3	,8	100	554
	Clase IVb	79,7	20,3	28,7	51,0	18,6	,7	1,0	100	253
	Clase V	71,2	28,8	18,9	52,3	18,9	7,1	2,9	100	243
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Población General	83,8	16,2	28,7	55,1	12,9	2,1	1,1	100	1801
	Población Gitana (IC95%)	78,3 (69,9-86,0)	21,7 (14,0-30,1)	29,4	48,9	17,3	3,0	1,4	100	96
De 35 a 54 años	Clase I	87,0	13,0	32,5	54,5	10,4	1,0	1,7	100	483
	Clase II	78,8	21,2	21,5	57,3	13,6	4,9	2,8	100	506
	Clase III	78,9	21,1	18,4	60,5	16,7	2,9	1,6	100	1141
	Clase IVa	71,3	28,7	14,8	56,5	23,0	4,5	1,2	100	1170
	Clase IVb	73,3	26,7	17,6	55,7	20,8	4,0	1,9	100	543
	Clase V	67,4	32,6	12,8	54,6	25,0	4,6	3,0	100	508
	No consta	83,2	16,8	20,0	63,1	10,1	6,8	,0	100	49
	Población General	75,9	24,1	18,7	57,2	18,6	3,7	1,8	100	4400
	Población Gitana (IC95%)	65,6 (57,9-72,7)	34,4 (27,3-42,1)	13,1	52,5	28,0	4,7	1,7	100	152
De 55 y más años	Clase I	73,2	26,8	17,7	55,5	18,6	5,7	2,4	100	357
	Clase II	59,4	40,6	13,7	45,8	24,2	11,6	4,8	100	330
	Clase III	54,4	45,6	10,8	43,6	33,3	10,0	2,3	100	1238
	Clase IVa	48,7	51,3	6,7	42,0	36,2	10,7	4,3	100	1324
	Clase IVb	44,7	55,3	6,2	38,5	41,1	11,0	3,2	100	528
	Clase V	44,6	55,4	5,7	38,8	39,8	12,6	3,0	100	564
	No consta	49,9	50,1	2,3	47,6	31,5	14,9	3,7	100	55
	Población General	52,3	47,7	9,0	43,3	33,8	10,5	3,4	100	4396
	Población Gitana (IC95%)	33,4 (22,6-45,6)	66,6 (54,4-77,4)	5,0	28,4	36,2	26,5	3,9	100	66

Tabla 1.2b. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)						
		Muy bueno, bueno	Regular, malo, muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
De 0 a 4 años	Clase I	84,8	15,2	37,4	47,4	14,3	,1	,8	100	161
	Clase II	86,5	13,5	41,0	45,5	11,9	1,6	,0	100	176
	Clase III	84,9	15,1	39,1	45,8	11,4	2,5	1,1	100	286
	Clase IVa	84,9	15,1	36,3	48,6	11,9	2,1	1,0	100	444
	Clase IVb	82,0	18,0	27,9	54,1	13,3	4,6	,1	100	190
	Clase V	78,6	21,4	37,9	40,7	18,3	,8	2,2	100	165
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Población General	84,0	16,0	36,5	47,5	13,1	2,0	,9	100	1437
	Población Gitana (IC95%)	83,4 (73,9-90,4)	16,6 (9,6-26,1)	29,6	53,8	13,9	2,7	,0	100	79
De 5 a 9 años	Clase I	95,6	4,4	58,7	36,9	4,1	,2	,0	100	152
	Clase II	96,8	3,2	53,1	43,7	3,0	,0	,2	100	138
	Clase III	90,0	10,0	38,7	51,3	9,8	,3	,0	100	308
	Clase IVa	85,3	14,7	35,6	49,6	12,2	2,5	,1	100	328
	Clase IVb	85,7	14,3	45,4	40,3	12,0	1,5	,8	100	168
	Clase V	86,0	14,0	28,9	57,1	10,2	3,8	,0	100	145
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población General	89,3	10,7	41,7	47,6	9,2	1,4	,2	100	1252
	Población Gitana (IC95%)	86,1 (77,0-92,8)	13,9 (7,2-23,0)	36,0	50,1	11,2	2,7	,0	100	77
De 10 a 15 años	Clase I	96,3	3,7	49,7	46,6	3,1	,3	,3	100	200
	Clase II	89,3	10,7	34,2	55,1	10,0	,0	,8	100	199
	Clase III	89,6	10,4	43,5	46,1	9,8	,3	,3	100	466
	Clase IVa	86,7	13,3	35,2	51,6	12,7	,5	,1	100	561
	Clase IVb	89,8	10,2	33,2	56,6	9,4	,8	,0	100	245
	Clase V	90,8	9,2	31,4	59,4	8,6	,6	,0	100	233
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Población General	89,8	10,2	38,2	51,6	9,5	,4	,2	100	1927
	Población Gitana (IC95%)	93,2 (87,7-97,1)	6,8 (2,9-12,3)	46,3	46,9	3,6	2,2	1,0	100	108

Tabla 1.2c. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)							
		Muy bueno/bueno	Regular/malo/muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total		
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
De 16 a 24 años	Clase I	89,9	10,1	38,2	51,7	7,0	,0	3,1	100	78	
	Clase II	84,4	15,6	26,1	58,3	15,0	,6	,0	100	119	
	Clase III	83,7	16,3	36,1	47,6	13,9	2,2	,3	100	237	
	Clase IVa	83,1	16,9	29,2	53,9	16,1	,7	,0	100	328	
	Clase IVb	81,4	18,6	32,9	48,5	16,0	2,3	,3	100	190	
	Clase V	78,2	21,8	26,9	51,4	17,7	1,5	2,6	100	141	
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	Población General	83,1	16,9	31,2	51,9	14,9	1,4	,6	100	1120	
	Población Gitana (IC95%)	76,9 (69,1-83,0)	23,1 (17,0-30,9)	31,5	45,4	20,0	2,4	,8	100	138	
De 25 a 34 años	Clase I	81,2	18,8	25,1	56,0	16,6	1,2	1,1	100	250	
	Clase II	80,9	19,1	23,7	57,2	17,2	1,4	,6	100	287	
	Clase III	79,8	20,2	23,8	56,0	16,3	2,9	1,0	100	584	
	Clase IVa	79,7	20,3	24,6	55,1	16,6	3,1	,6	100	740	
	Clase IVb	71,9	28,1	20,1	51,7	24,1	2,9	1,1	100	423	
	Clase V	76,4	23,6	25,4	51,1	19,4	3,9	,3	100	334	
	No consta	70,6	29,4	15,0	55,6	22,3	2,7	4,4	100	39	
	Población General	78,1	21,9	23,6	54,5	18,3	2,8	,9	100	2657	
	Población Gitana (IC95%)	78,8 (71,4-85,1)	21,2 (14,9-28,6)	26,1	52,7	15,5	3,9	1,8	100	140	
De 35 a 54 años	Clase I	80,3	19,7	23,6	56,7	16,1	2,3	1,3	100	777	
	Clase II	71,1	28,9	21,7	49,4	22,4	5,3	1,2	100	754	
	Clase III	69,3	30,7	16,2	53,1	23,0	5,5	2,2	100	1610	
	Clase IVa	58,9	41,1	11,8	47,1	33,4	4,9	2,8	100	1571	
	Clase IVb	58,8	41,2	11,8	47,0	28,8	8,7	3,6	100	871	
	Clase V	61,0	39,0	11,0	50,0	29,0	7,7	2,2	100	706	
	No consta	64,4	35,6	12,9	51,5	23,2	10,1	2,2	100	98	
	Población General	65,7	34,3	15,3	50,4	26,3	5,8	2,3	100	6387	
	Población Gitana (IC95%)	51,4 (43,9-59,1)	48,6 (40,9-56,1)	12,7	38,7	36,8	9,7	2,1	100	168	
De 55 y más años	Clase I	59,6	40,4	13,8	45,8	32,5	5,2	2,7	100	404	
	Clase II	49,9	50,1	8,7	41,2	38,4	7,8	3,9	100	562	
	Clase III	41,6	58,4	7,5	34,1	41,0	12,7	4,6	100	2014	
	Clase IVa	32,6	67,4	4,5	28,1	46,2	16,8	4,4	100	1971	
	Clase IVb	32,2	67,8	4,6	27,6	46,1	15,2	6,6	100	1023	
	Clase V	32,8	67,2	5,4	27,4	41,0	20,1	6,1	100	1351	
	No consta	38,8	61,2	8,7	30,1	41,8	13,9	5,5	100	344	
	Población General	38,2	61,8	6,5	31,7	42,3	14,6	4,9	100	7669	
	Población Gitana (IC95%)	10,5 (5,2-18,1)	89,5 (81,9-94,8)	1,8	8,7	60,8	19,1	9,6	100	81	

Tabla 1.2d. Estado de salud percibido. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)						
		Muy bueno, bueno	Regular, malo, muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
De 0 a 4 años	Clase I	80,4	19,6	39,2	41,2	16,0	2,3	1,3	100	182
	Clase II	95,1	4,9	52,0	43,1	4,9	,0	,0	100	176
	Clase III	90,0	10,0	47,1	42,9	8,6	1,0	,4	100	285
	Clase IVa	89,9	10,1	41,9	48,0	9,1	1,0	,0	100	437
	Clase IVb	87,9	12,1	40,3	47,6	8,3	,1	3,8	100	170
	Clase V	81,8	18,2	39,0	42,8	14,4	2,2	1,6	100	166
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	Población General	87,8	12,2	43,1	44,7	10,2	1,1	,9	100	1432
	Población Gitana (IC95%)	75,3 (64,7-84,6)	24,7 (15,4-35,3)	40,1	35,1	21,2	1,3	2,2	100	67
De 5 a 9 años	Clase I	94,5	5,5	57,8	36,6	5,5	,0	,0	100	144
	Clase II	89,3	10,7	42,3	47,1	10,0	,0	,7	100	139
	Clase III	93,0	7,0	40,7	52,3	7,0	,0	,0	100	307
	Clase IVa	90,3	9,7	38,8	51,6	9,1	,5	,1	100	347
	Clase IVb	80,0	20,0	37,8	42,1	16,3	2,3	1,4	100	167
	Clase V	87,6	12,4	38,4	49,2	12,3	,1	,0	100	150
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Población General	89,9	10,1	42,1	47,8	9,4	,4	,3	100	1269
	Población Gitana (IC95%)	87,9 (80,0-94,2)	12,1 (5,8-20,0)	30,0	57,9	7,4	2,7	2,0	100	78
De 10 a 15 años	Clase I	96,2	3,8	45,5	50,7	2,4	,2	1,1	100	182
	Clase II	90,5	9,5	41,8	48,7	9,1	,0	,4	100	187
	Clase III	92,1	7,9	40,6	51,6	7,1	,1	,7	100	461
	Clase IVa	90,1	9,9	35,2	55,0	8,6	,9	,3	100	506
	Clase IVb	84,4	15,6	35,7	48,7	12,8	2,3	,5	100	231
	Clase V	90,7	9,3	37,2	53,5	8,5	,8	,0	100	212
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	Población General	90,9	9,1	39,0	52,0	7,9	,7	,5	100	1805
	Población Gitana (IC95%)	92,7 (85,4-96,5)	7,3 (3,5-14,6)	40,5	52,2	7,3	,0	,0	100	94

En la población gitana el porcentaje de hombres que define su salud como muy buena o buena desciende progresivamente conforme aumenta la edad. En el grupo de edad de 16 a 24 años un 90,8% describe su estado de salud como bueno o muy bueno, frente al 33,4% a partir de los 55 años. Este descenso es más acusado que el que se observa en la población general en la que esas cifras son 91,3% a los 16-24 y 52,3% después de los 55 años.

Los hombres gitanos con mayor nivel educativo señalan tener mejor estado de salud, incluso cuando se ajusta por edad (ver tabla 1.3c). Sin embargo, el tipo de vivienda no muestra resultados significativos sobre la probabilidad de definir la salud como regular, mala o muy mala.

En las mujeres gitanas la descripción del estado de salud propio, que como se ha dicho es peor que en la población masculina, tiende a empeorar muy rápidamente con la edad. En las mayores de 55 años, sólo un 10,5% describe su estado de salud en términos positivos, frente al 76,9% a los 16-24 años de edad. Este empeoramiento de la percepción de la salud conforme aumenta la edad es también mucho más acusado que en la población general de España, donde a los 55 y más años todavía se encuentra un 38,2% de mujeres que describe su salud como buena o muy buena, y un 83,1% entre los 16 y 24 años.

Entre las mujeres gitanas, aquellas que cuentan con mayor nivel de estudios son las que perciben tener un mejor estado de salud, una vez ajustado el efecto de la edad (ver tabla 1.3c). En el caso de las mujeres, a diferencia de lo que ocurría en los hombres, vivir en infravivienda o chabola tiene un efecto negativo muy notable sobre la autopercepción del estado de salud $OR_{95} (2,48-16,99)$, $p < 0,001$.

Resumen

- *Las mujeres gitanas perciben peor su estado de salud que los hombres gitanos, acusan más el efecto de la edad y de vivir en viviendas no normalizadas.*
- *La educación tiene un efecto protector sobre el estado de salud percibido en la población gitana (hombres y mujeres).*
- *El deterioro de la percepción del estado de la salud en la población gitana adulta, masculina y femenina, conforme aumenta la edad es muy rápido y acentuado.*

Tabla 1.3a. Estado de salud percibido. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)						
		Muy bueno/ bueno	Regu- lar/malo/muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no pondera- do)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	90,8	9,2	35,7	55,1	8,6	,6	,0	100	149
	De 25 a 34 años	78,3	21,7	29,4	48,9	17,3	3,0	1,4	100	96
	De 35 a 54 años	65,6	34,4	13,1	52,5	28,0	4,7	1,7	100	152
	De 55 y más años	33,4	66,6	5,0	28,4	36,2	26,5	3,9	100	66
	Total	71,9	28,1	22,6	49,3	20,7	6,0	1,4	100	463
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	37,8	62,2	5,2	32,6	42,5	19,7	,0	100	40
	Leer y escribir /primarios incompletos	68,4	31,6	17,9	50,5	24,7	5,6	1,3	100	241
	Primarios completos	79,5	20,5	26,2	53,3	12,5	5,1	2,8	100	86
	Secundarios o superiores	84,5	15,5	38,8	45,7	12,5	2,0	1,0	100	82
	Total	71,1	28,9	22,5	48,6	21,5	6,0	1,4	100	449
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	86,9	13,1	27,0	59,9	11,1	2,0	,0	100	48
	Trab. cuenta ajena Temporal	77,8	22,2	27,8	49,9	18,4	3,8	,0	100	97
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	73,1	26,9	18,5	54,7	23,2	3,7	,0	100	81
	Ayuda familiar	89,5	10,5	33,0	56,5	10,5	,0	,0	100	45
	Parado ha trabajado antes	72,4	27,6	23,8	48,6	24,1	2,5	1,1	100	82
	Parado busca primer empleo	82,2	17,8	36,1	46,1	16,1	,0	1,7	100	32
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Jubilado	27,7	72,3	2,5	25,3	36,5	27,8	8,0	100	68
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Total	71,9	28,1	22,6	49,3	20,7	6,0	1,4	100	463
Tipo de vivienda	Normalizada	72,0	28,0	23,5	48,5	20,4	6,1	1,5	100	423
	Infravivienda/chabola	71,7	28,3	12,2	59,4	24,4	3,9	,0	100	39
	Total	72,0	28,0	22,6	49,3	20,7	5,9	1,4	100	462
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	71,3	28,7	24,0	47,3	21,2	6,0	1,4	100	419
	No	78,9	21,1	7,9	71,0	15,1	4,8	1,2	100	43
	Total	72,0	28,0	22,6	49,3	20,7	5,9	1,4	100	462
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	71,5	28,5	25,0	46,5	21,5	5,8	1,3	100	324
	Integrado y malas condiciones	74,4	25,6	23,1	51,3	18,8	6,8	,0	100	54
	Alejado y buenas condiciones	78,6	21,4	14,3	64,3	15,5	5,9	,0	100	52
	Alejado y malas condi- ciones	63,1	36,9	10,3	52,7	24,2	6,0	6,7	100	32
	Total	72,0	28,0	22,6	49,3	20,7	5,9	1,4	100	462

Tabla 1.3b Estado de salud percibido. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Estado de salud (dicotómico)		En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (desagregado)						
		Muy bueno/bueno	Regular/malo/muy malo	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	76,9	23,1	31,5	45,4	20,0	2,4	,8	100	138
	De 25 a 34 años	78,8	21,2	26,1	52,7	15,5	3,9	1,8	100	140
	De 35 a 54 años	51,4	48,6	12,7	38,7	36,8	9,7	2,1	100	168
	De 55 y más años	10,5	89,5	1,8	8,7	60,8	19,1	9,6	100	81
	Total	58,6	41,4	19,4	39,2	30,7	7,8	2,9	100	527
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	19,0	81,0	7,0	11,9	55,0	17,6	8,4	100	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	59,0	41,0	14,6	44,4	30,8	7,8	2,4	100	282
	Primarios completos	75,1	24,9	30,1	45,0	17,3	5,5	2,2	100	73
	Secundarios o superiores	82,1	17,9	35,7	46,4	16,5	1,4	,0	100	70
	Total	58,4	41,6	18,8	39,5	30,5	8,1	3,0	100	509
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fija	63,8	36,2	21,4	42,3	32,9	3,4	,0	100	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	65,9	34,1	27,2	38,6	27,8	5,6	,7	100	82
	Trab. cuenta propia Autónoma o Empresaria	48,8	51,2	12,5	36,3	46,4	4,8	,0	100	42
	Ayuda familiar	73,8	26,2	24,8	49,0	18,2	6,8	1,2	100	37
	Parada ha trabajado antes	70,0	30,0	21,8	48,2	20,9	4,9	4,1	100	55
	Parada busca primer empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Jubilada	20,6	79,4	6,3	14,3	55,3	12,9	11,2	100	66
	Labores del hogar	59,8	40,2	17,9	41,9	27,7	10,8	1,8	100	173
	Total	58,6	41,4	19,4	39,2	30,7	7,8	2,9	100	527
Tipo de vivienda	Normalizada	60,8	39,2	20,4	40,4	29,6	7,3	2,3	100	486
	Infravivienda/chabola	27,2	72,8	6,0	21,1	43,5	16,4	13,0	100	37
	Total	58,8	41,2	19,6	39,2	30,5	7,9	2,9	100	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	58,6	41,4	20,1	38,5	31,4	7,4	2,7	100	476
	No	61,5	38,5	12,8	48,7	18,9	13,8	5,8	100	47
	Total	58,8	41,2	19,6	39,2	30,5	7,9	2,9	100	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	59,9	40,1	21,7	38,3	30,8	7,6	1,7	100	377
	Integrado y malas condiciones	61,1	38,9	18,5	42,6	25,1	6,1	7,7	100	58
	Alejado y buenas condiciones	55,6	44,4	11,3	44,3	36,4	4,6	3,4	100	49
	Alejado y malas condiciones	47,2	52,8	10,7	36,6	27,7	18,1	7,1	100	39
	Total	58,8	41,2	19,6	39,2	30,5	7,9	2,9	100	523

Tabla 1.3c. Estado de salud percibido. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Estado De Salud Percibido) (1=Regular, Mala O Muy Mala; 0=Buena O Muy Buena)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	1,055	1,038	1,071	,000	1,072	1,053	1,090
Educación	No sabe leer y escribir	,023				,009			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,012	,350	,154	,793	,008	,395	,199	,780
	Primarios completos	,004	,243	,093	,635	,002	,257	,110	,600
	Secundarios o superiores	,007	,250	,092	,682	,004	,265	,107	,659
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,470	,712	,283	1,790	,000	5,747	2,255	14,642

1.3 Resumen de resultados

La valoración del estado de salud de los hombres gitanos es mejor que en las mujeres gitanas en todos los grupos de edad.

En términos relativos, la población gitana mayor de 35 años tiene una peor valoración de su estado de salud que la población general.

El deterioro con la edad del estado de salud en la población gitana es más rápido y grave que en la población general de España, sobre todo en las mujeres.

Para las mujeres gitanas vivir en una vivienda con malas condiciones (infravivienda o chabola) tiene un efecto negativo sobre la percepción del estado de salud. Sin embargo, el incremento del nivel educativo mejora la percepción del estado de salud, tanto en hombres como en mujeres gitanas.

- En los hombres gitanos mayores de 55 años un 33,4% describe su salud como buena o muy buena, frente al 52,3% de la población general. En la población general estas cifras son del 44,6% en clase social V (obreros manuales no cualificados) y 73,2% en los hombres en clase social I (profesionales asociadas a títulos universitarios de ciclo largo).
- En las mujeres gitanas mayores de 55 años sólo un 10,5% describe su salud como buena o muy buena, frente al 38,2% en la población general. En clase social V se alcanza el 32,8% y en clase I el 59,6% de las mujeres de la misma edad.

1.4 Prioridades de intervención.

El estado de salud percibido, en la medida que es un indicador que aproxima problemas como la probabilidad de mortalidad, la presencia de enfermedades y la probabilidad de utilizar los

servicios sanitarios, indica la existencia de importantes problemas de salud y de desigualdad en salud en la población gitana. Permite identificar como objetivos prioritarios:

- Invertir en la salud de la infancia gitana para producir cambios que se mantengan en el tiempo y prevenir la acumulación de los efectos negativos de una mala salud en el ciclo de vida.
- Atender la salud de las mujeres.
- Dirigir la actuación a reducir el rápido envejecimiento de hombres y mujeres.
- Orientar la acción hacia los determinantes socioeconómicos de la salud de la población gitana, con perspectiva de género, desde la infancia. El acceso a la educación y la mejora de la calidad de la vivienda son dos áreas estratégicas.

1.5 Prioridades de investigación.

Realización de estudios longitudinales en la población gitana que permitan establecer a lo largo del ciclo de vida la relación entre percepción de salud, morbilidad, estilos de vida, condiciones socioeconómicas multinivel (individual, hogar, espacio social) y mortalidad. La integración de la perspectiva longitudinal cuantitativa y cualitativa en este tipo de investigación sería valiosa para valorar las pautas culturales de respuesta a las preguntas habituales en las encuestas de salud.