

2 Problemas de salud y limitación de actividad principal.

Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades Intervención
- Prioridades Investigación

Índice de tablas

Tabla 2.1a. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 2.1a. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 2.1b. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 2.2a. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres

Tabla 2.2a. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Hombres.

Tabla 2.2b. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Tabla 2.2b. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Tabla 2.2c. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Tabla 2.2d. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.

Tabla 2.3a. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Tabla 2.3a. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Tabla 2.3b. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Tabla 2.3b. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Tabla 2.3c. Hipertensión arterial. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3d. Colesterol elevado. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3e. Diabetes. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3f. Asma, bronquitis crónica, enfisema. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3g. Enfermedad del corazón. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3h. Úlcera de estómago. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3i. Alergia. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3j. Depresión. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3k. Otras enfermedades mentales. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3l. Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3m. Mala circulación. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3n. Hernias. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3ñ. Artrosis y problemas reumáticos. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3o. Osteoporosis. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.3p. Próstata (hombres) y problemas período menopáusico (mujeres). Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 2.4a. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 2.4b. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 2.5a. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.

Tabla 2.5b. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.

Tabla 2.6a. Limitación de la actividad principal. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo.

Tabla 2.6b. Limitación actividad principal. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

2.1 Introducción

El cuestionario de la Encuesta de Salud a la Comunidad Gitana 2006 y el de la Encuesta Nacional de Salud de 2003 se incluía la siguiente pregunta que permite valorar la presencia de distintas enfermedades o problemas de salud.

7. ¿Le ha dicho su médico que padece de forma crónica alguna de las siguientes enfermedades o problemas de salud en la actualidad? (Entrevistador: léale al entrevistado las enfermedades que se relacionan una a una, anotando la respuesta que proceda. Si el sujeto de la entrevista es varón anote NO en la opción 15 y si es mujer anote NO en la 16, directamente)

	SI	NO		SI	NO
1. Hipertensión arterial _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	9. Otras enfermedades mentales _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
2. Colesterol elevado _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	10. Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
3. Diabetes (azúcar elevado) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	11. Mala circulación _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
4. Asma, bronquitis crónica o enfisema _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	12. Hemias _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
5. Enfermedad del corazón _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	13. Artrosis y problemas reumáticos _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
6. Úlcera de estómago _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	14. Osteoporosis _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
7. Alergia _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	15. Problemas del periodo menopáusico (excepto osteoporosis) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
8. Depresión _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	16. Problemas de la próstata _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6

Por su planteamiento, la pregunta se refiere a enfermedades diagnosticadas por personal médico por lo que las variaciones en los porcentajes se deberán tanto a la presencia de problemas como a la accesibilidad a los servicios de medicina general y especializada, sin olvidar algunos posibles sesgos de la persona entrevistada (recuerdo, comprensión de la pregunta, etc.).

Se trata en cualquier caso de una pregunta útil para aproximar la presencia de distintos problemas de salud en la comparación de la población gitana con la población general de España.

Complementariamente, en el cuestionario se incluía una pregunta sobre la limitación de la actividad principal, en los siguientes términos: “Durante las dos últimas semanas, ¿ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudio, labores del hogar, etc.) por alguno o varios dolores o síntomas?”, que permite aproximar los efectos globales del estado de salud de la persona en su capacidad de desarrollar su actividad. Se trata por tanto de un indicador que permite valorar la salud como un recurso vital, a partir del cual la persona puede satisfacer otras necesidades básicas, en la línea de los planteamientos sobre las capacidades de Amartya Sen¹⁸.

¹⁸ Sen, Amartya (1995) *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza.
Sen, Amartya (2000) *Desarrollo y libertad*. Barcelona: Planeta.

2.2 Resultados detallados

La comparación de la presencia de distintos problemas de salud o enfermedades crónicas en la población gitana con la de la población general debe realizarse teniendo en cuenta los grupos de edad. En cualquier caso, los datos agregados, muestran que a pesar de la mayor juventud de la población gitana algunos problemas de salud son muy frecuentes. En los hombres gitanos llama la atención la mayor presencia de problemas de colesterol, asma, bronquitis crónica o enfisema, úlcera de estómago, alergia, depresión, otras enfermedades mentales, jaquecas o migrañas, mala circulación y hernias. En las mujeres gitanas también existe una presencia relativa elevada de dichos problemas, sobre todo teniendo en cuenta la mayor juventud de esta población en el caso de la úlcera de estómago, alergia, depresión, otras enfermedades mentales, jaquecas o migrañas, mala circulación y complicaciones relacionadas con la menopausia.

En la población infantil tanto de niños como de niñas, en los datos agregados, la presencia de problemas de asma, bronquitis crónica o enfisema y de jaquecas o migrañas es superior en la población gitana.

Tabla 2.1a. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hipertensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Total
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Hombres	Clase I	12,7	9,2	2,7	2,9	4,9	1,7	10,7	,8	689
	Clase II	11,4	10,1	4,8	4,5	5,4	2,2	11,1	1,8	962
	Clase III	13,2	8,8	5,2	4,0	5,6	2,3	8,2	2,8	2612
	Clase IVa	12,8	10,1	6,4	7,0	6,3	3,2	8,5	3,2	3113
	Clase IVb	12,4	9,2	6,1	6,9	5,6	2,3	8,7	3,7	1190
	Clase V	11,2	11,0	6,4	7,5	5,9	3,9	7,2	3,9	1172
	Otros	6,2	2,7	3,5	6,3	5,3	4,3	9,4	1,2	101
	No consta	2,1	6,1	14,5	3,5	6,4	7,1	6,6	16,6	36
	Población general	12,4	9,6	5,6	5,7	5,8	2,8	8,7	2,9	9875
	Población gitana (IC95%)	13,1 (10,1-16,3)	13,6 (10,7-17)	4,7 (3,0-6,9)	9,7 (7,3-12,8)	4,0 (2,5-6,2)	9,5 (7,1-12,6)	12,9 (10,1-16,3)	7,5 (5,3-10,1)	466
Mujeres	Clase I	8,2	8,2	3,0	2,3	4,6	,9	11,5	3,4	847
	Clase II	11,8	7,9	3,6	3,3	4,1	1,7	11,7	5,0	1013
	Clase III	16,8	12,3	5,9	5,5	5,7	1,7	10,8	8,1	3137
	Clase IVa	17,7	10,8	6,1	5,6	5,9	2,5	11,1	8,0	3280
	Clase IVb	16,4	11,4	7,7	6,6	5,1	3,0	10,2	8,6	1650
	Clase V	21,8	14,4	9,5	6,8	9,0	3,1	10,4	10,4	1638
	Otros	24,7	13,7	7,4	,4	8,7	2,1	8,4	5,1	103
	No consta	20,2	10,1	7,8	,9	9,5	5,2	12,5	10,2	107
	Población general	16,5	11,3	6,2	5,3	5,9	2,3	10,9	7,7	11775
	Población gitana (IC95%)	16,8 (13,7-20,2)	11,7 (9,1-14,7)	6,4 (4,5-8,8)	7,6 (5,5-10,1)	5,4 (3,6-7,5)	7,7 (5,6-10,3)	16,4 (13,4-19,7)	17,6 (14,4-21,0)	526

Tabla 2.1a. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas, dolor de cabeza	Mala circulación	Hernias	Artrosis y problemas reumáticos	Osteoporosis	Periodo menopausico	Próstata	Total
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Hombres	Clase I	1,4	3,6	1,9	5,1	6,1	,0	-	3,3	689
	Clase II	1,7	2,7	5,0	4,9	7,9	,8	-	4,4	962
	Clase III	1,3	3,9	6,0	5,9	9,7	,9	-	5,3	2612
	Clase IVa	1,6	3,9	7,7	5,7	11,8	,7	-	4,9	3113
	Clase IVb	1,5	4,4	6,0	3,6	9,5	1,0	-	3,6	1190
	Clase V	3,7	5,2	7,3	6,8	12,9	,8	-	6,0	1172
	Otros	4,7	1,7	2,9	3,8	4,9	1,4	-	6,0	101
	No consta	18,6	7,6	4,3	6,4	6,6	,0	-	3,8	36
	Población general	1,9	3,9	6,2	5,5	10,2	,7	-	4,8	9875
	Población gitana (IC95%)	4,8 (3,0-6,9)	20,7 (17,2-24,6)	10,0 (7,5-13,0)	7,4 (5,3-10,1)	10,3 (7,7-13,3)	1,8 (0,8-3,2)	-	4,4 (2,7-6,4)	466
Mujeres	Clase I	1,8	6,0	7,6	2,8	11,1	5,2	2,3	-	847
	Clase II	1,3	6,8	11,6	4,2	15,7	6,7	3,0	-	1013
	Clase III	2,4	8,4	15,7	5,5	24,2	8,0	2,7	-	3137
	Clase IVa	1,8	10,5	16,5	5,2	22,7	6,9	3,2	-	3280
	Clase IVb	1,5	9,2	16,8	4,0	22,5	6,5	2,4	-	1650
	Clase V	2,5	10,2	21,3	5,6	29,3	10,3	2,1	-	1638
	Otros	4,0	7,5	16,0	5,1	29,2	10,5	3,1	-	103
	No consta	6,9	10,2	12,5	5,3	21,8	7,6	4,0	-	107
	Población general	2,0	9,0	15,7	4,9	22,3	7,4	2,7	-	11775
	Población gitana (IC95%)	5,9 (4,2-8,3)	37,1 (33,0-41,3)	24,4 (20,9-28,3)	8,6 (6,3-11,1)	19,7 (16,5-23,4)	6,6 (4,7-9,0)	7,8 (5,6-10,3)	-	526

Tabla 2.1b. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Hiper-tensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enferme-dad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza	Hernias	Total
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	,0	,1	,0	6,0	,9	,0	7,0	,0	,3	1,2	,0	303
	Clase II	,3	,5	,0	5,5	,0	,0	10,1	,2	,7	1,2	,0	377
	Clase III	,5	,1	,5	4,5	,5	,0	11,7	,2	,9	1,4	,2	757
	Clase IVa	,0	1,1	,1	4,8	,5	,0	9,4	,1	,7	,6	,5	1002
	Clase IVb	,0	,8	,2	6,6	1,2	,0	10,0	,3	1,5	1,4	,1	448
	Clase V	,0	,0	,0	6,4	,3	,0	13,4	,2	,6	1,2	,5	382
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Población General	,1	,6	,2	5,4	,5	,0	10,3	,2	,8	1,1	,3	3307
	Población gitana (IC95%)	,9 (0,1-2,5)	1,3 (0,3-3,1)	,4 (0,0-1,8)	13,3 (9,7-18,1)	,8 (0,1-2,5)	,4 (0,0-1,8)	10,6 (7,4-15,0)	,8 (0,1-2,5)	1,9 (0,7-4,2)	3,6 (1,7-6,3)	,2 (0,0-1,8)	264
Niñas	Clase I	,0	,5	,0	2,2	,2	,0	6,4	,0	,3	,1	,0	290
	Clase II	,0	,4	,0	1,2	1,1	,0	5,0	,0	,7	,8	,1	366
	Clase III	,4	,6	,0	3,5	,4	,0	8,2	,0	,3	1,5	,0	726
	Clase IVa	,2	1,0	,3	3,8	1,3	,0	9,7	,3	,1	3,2	,2	950
	Clase IVb	,0	,2	,1	4,4	,9	,0	10,7	,2	,3	2,1	,0	427
	Clase V	,2	,1	,0	4,9	,6	,2	7,8	,1	,7	1,7	,2	354
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Población General	,2	,6	,1	3,5	,8	,0	8,4	,1	,3	1,9	,1	3156
	Población gitana (IC95%)	,6 (0,0-2,0)	1,8 (0,5-4,0)	,8 (0,1-2,7)	8,0 (5,0-12,0)	1,5 (0,5-4,0)	,0 (0,0-2,0)	10,8 (7,4-15,4)	,6 (0,0-2,0)	1,4 (0,3-3,4)	6,4 (3,7-10,0)	1,2 (0,3-3,4)	238

Debido al importante efecto de la edad en la mayoría de los problemas de salud sobre los que se pregunta resulta especialmente relevante la comparación entre población gitana y la población general por grupos de edad.

En el caso de los hombres para la mayoría de los problemas de salud o enfermedades crónicas incluidos en el cuestionario se encuentra una mayor prevalencia en la población gitana que en la población general cuando son mayores de 35 años. La excepción se encuentra en el caso de la diabetes, enfermedades del corazón, alergia, artrosis, osteoporosis y problemas de próstata. En los grupos de edad más jóvenes, múltiples problemas tienen niveles equivalentes en ambas poblaciones. Sin embargo la presencia de varios problemas también es mayor en la población gitana más joven: asma, bronquitis o enfisema, úlcera de estómago, depresión, jaquecas o migrañas y artrosis o problemas reumáticos.

En las mujeres mayores de 35 años se observa igualmente que todos los problemas estudiados encuentran prevalencias mucho más elevadas en las mujeres gitanas que en las de la población general (excepto en el caso del asma, bronquitis o enfisema y la osteoporosis). Esta situación se encuentra incluso en los grupos más jóvenes para enfermedades la depresión, las jaquecas o migrañas y la mala circulación.

En los menores de 15 años los problemas más frecuentes son las alergias y el asma en las dos poblaciones estudiadas. En el caso de los menores gitanos la prevalencia de asma, bronquitis o enfisema es mayor.

Resumen

- *La mayoría de los problemas de salud y enfermedades crónicas incrementan su prevalencia conforme aumenta la edad por lo que la comparación entre la población gitana y la población general debe realizarse teniendo en cuenta los grupos de edad.*
- *Para múltiples problemas de salud estudiados (colesterol, depresión, úlcera de estómago, jaquecas o migrañas, etc...) la prevalencia es mayor en la población gitana, hombres y mujeres, mayores de 35 años. En algunos casos también en edades más jóvenes.*

Tabla 2.2a. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		Hipertensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Total
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)
De 16 a 24 años	Clase I	2,5	,0	,0	3,6	,0	,5	23,5	,0	69
	Clase II	,0	1,4	1,0	1,6	,3	,0	17,6	,0	105
	Clase III	,4	,3	,0	1,9	,6	,0	16,3	,0	257
	Clase IVa	,2	,0	,9	4,6	,6	,7	13,3	1,4	326
	Clase IVb	,2	,5	,5	3,8	,5	,2	13,2	1,7	149
	Clase V	,3	,0	,0	3,5	2,6	,0	8,3	1,3	134
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Población general	,4	,3	,4	3,2	,8	,3	14,3	,8	1060
	Población gitana (IC95%)	2,4 (0,9-6,3)	1,4 (0,2-4,3)	,3 (0,0-1,7)	8,9 (4,9-14,0)	,0 (0,0-1,7)	6,0 (3,0-10,7)	15,6 (10,2-21,8)	3,2 (1,2-7,2)	151
De 25 a 34 años	Clase I	3,4	3,2	,0	2,4	,0	,6	11,9	,2	110
	Clase II	,2	2,2	,0	5,4	,2	1,9	14,9	1,0	165
	Clase III	1,9	,9	1,2	1,5	,3	1,2	12,2	1,4	366
	Clase IVa	1,3	2,6	,4	2,7	1,2	1,0	10,0	2,6	485
	Clase IVb	2,9	4,1	1,8	2,7	,0	1,6	11,0	,9	220
	Clase V	1,5	3,0	,6	1,8	,9	3,6	12,6	1,6	192
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población general	1,7	2,4	,9	2,5	,6	1,5	11,5	1,6	1559
	Población gitana (IC95%)	5,3 (1,9-10,7)	10,3 (5,2-17,1)	1,6 (0,4-6,3)	9,0 (4,5-15,8)	,0 (0,0-2,5)	8,2 (3,8-14,6)	12,7 (7,4-20,7)	6,6 (3,1-13,3)	97
De 35 a 54 años	Clase I	8,5	10,4	4,1	1,2	3,3	1,8	9,1	1,1	340
	Clase II	7,9	11,1	3,5	2,2	1,7	2,3	9,9	1,3	445
	Clase III	9,3	10,0	1,7	1,3	2,2	1,7	6,6	2,4	930
	Clase IVa	8,0	10,2	2,6	3,7	1,8	3,3	7,5	2,5	1151
	Clase IVb	9,2	7,4	2,1	6,0	2,9	2,1	5,8	3,3	432
	Clase V	6,9	10,8	4,7	3,2	1,2	2,9	6,0	3,3	407
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población general	8,3	9,9	2,8	2,9	2,1	2,6	7,5	2,5	3747
	Población gitana (IC95%)	17,1 (11,9-23,7)	20,6 (14,6-27,2)	5,2 (2,4-9,4)	4,7 (2,0-8,6)	4,2 (2,0-8,6)	10,2 (6,1-15,7)	11,9 (7,7-17,9)	11,4 (7,1-17,2)	152
De 55 y más años	Clase I	34,8	18,1	4,2	6,0	15,4	3,4	4,8	1,4	170
	Clase II	35,0	21,4	13,9	9,4	19,9	3,7	5,3	4,5	247
	Clase III	30,3	16,2	13,9	9,5	14,8	4,8	3,7	5,2	1059
	Clase IVa	31,2	19,4	16,9	14,4	16,9	5,7	6,4	5,2	1151
	Clase IVb	34,1	22,5	19,2	14,3	17,9	4,5	7,0	8,2	389
	Clase V	27,6	21,9	15,2	17,9	15,9	7,1	4,4	7,3	439
	Otros	17,2	6,1	4,0	14,5	15,7	5,6	4,7	2,2	44
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Población general	31,2	19,2	15,0	12,6	16,4	5,2	5,3	5,5	3509
	Población gitana (IC95%)	40,6 (29,7-53,6)	30,8 (19,9-42,2)	19,1 (10,8-30,1)	25,3 (19,9-42,2)	19,1 (10,8-30,1)	18,1 (9,6-28,2)	9,6 (4,0-18,6)	9,1 (4,0-18,6)	66

Tabla 2.2a. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas, dolor de cabeza	Mala circulación	Hernias	Artrosis y problemas reumáticos	Osteoporosis	Próstata	Total
		%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
De 16 a 24 años	Clase I	,0	6,6	,0	,0	,3	,0	,0	69
	Clase II	1,2	4,2	1,5	,0	,0	,0	,0	105
	Clase III	,8	2,8	,4	,8	,3	,0	,0	257
	Clase IVa	1,0	3,0	,0	,8	,5	,0	,0	326
	Clase IVb	,5	5,2	,4	1,0	,0	,0	,0	149
	Clase V	2,7	1,8	,0	1,0	,0	,0	,0	134
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	12
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	8
	Población general	1,3	3,5	,3	,7	,2	,0	,0	1060
	Población gitana (IC95%)	1,7 (0,5-5,3)	18,0 (12,4-24,8)	1,1 (0,2-4,3)	1,1 (0,2-4,3)	3,3 (1,2-7,2)	,0 (0,0-1,7)	,0 (0,0-1,7)	151
De 25 a 34 años	Clase I	3,2	2,4	,0	1,1	,0	,0	,0	110
	Clase II	5,1	3,2	1,1	1,7	,2	,0	,0	165
	Clase III	1,1	2,7	,5	2,0	1,1	,0	,0	366
	Clase IVa	2,6	4,3	,7	2,6	1,6	,1	,0	485
	Clase IVb	,7	4,4	1,0	1,4	2,3	,4	,0	220
	Clase V	1,0	6,4	,2	2,4	1,2	,0	,0	192
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población general	2,2	3,9	,6	2,0	1,2	,1	,0	1559
	Población gitana (IC95%)	2,1 (0,4-6,3)	17,2 (10,6-25,3)	3,7 (1,3-9,3)	3,4 (0,8-7,8)	6,9 (3,1-13,3)	,9 (0,1-4,6)	,0 (0,0-2,5)	97
De 35 a 54 años	Clase I	1,7	4,4	1,3	7,1	4,3	,1	,0	340
	Clase II	,5	1,9	2,1	6,9	4,6	,2	1,6	445
	Clase III	1,5	4,3	2,6	5,5	4,6	,4	,4	930
	Clase IVa	1,2	4,0	4,3	5,5	7,2	,2	,9	1151
	Clase IVb	2,4	3,0	3,3	5,0	3,4	,3	,9	432
	Clase V	3,3	3,9	3,6	4,6	9,5	,8	,6	407
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población general	1,7	3,8	3,2	5,7	5,8	,3	,8	3747
	Población gitana (IC95%)	7,9 (4,2-12,6)	24,9 (18,5-32,1)	10,0 (6,1-15,7)	12,0 (7,7-17,9)	8,7 (5,2-14,2)	1,0 (0,2-4,1)	3,1 (1,2-6,9)	152
De 55 y más años	Clase I	,2	1,5	5,8	8,2	18,5	,0	14,2	170
	Clase II	1,0	2,5	15,8	7,5	25,7	3,1	15,9	247
	Clase III	1,5	4,6	15,6	11,1	24,6	2,3	16,2	1059
	Clase IVa	1,7	4,0	19,4	10,1	28,4	2,0	14,5	1151
	Clase IVb	1,9	5,6	18,3	5,9	30,8	2,9	12,8	389
	Clase V	6,4	7,5	19,8	15,1	30,9	1,6	18,7	439
	Otros	,0	3,2	5,9	7,8	14,6	4,2	17,9	44
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	10
	Población general	2,1	4,5	17,0	10,2	26,9	2,1	15,4	3509
	Población gitana (IC95%)	8,6 (3,0-16,6)	22,2 (13,3-33,6)	41,3 (29,7-53,6)	17,6 (9,6-28,2)	36,0 (25,4-48,8)	9,4 (4,0-18,6)	24,3 (14,6-35,4)	66

Tabla 2.2b. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		Hipertensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Total
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (NO PONDERADO)
De 16 a 24 años	Clase I	,0	,0	,0	,4	,0	,0	12,7	,0	70
	Clase II	,5	,0	,0	,9	,4	,6	6,7	1,7	90
	Clase III	,0	,7	2,3	5,0	,2	,4	11,9	2,1	220
	Clase IVa	,2	,9	,2	4,8	,1	,7	14,5	1,6	330
	Clase IVb	,5	,0	,0	6,4	,8	2,3	16,8	1,7	154
	Clase V	,5	,0	,0	1,6	,3	,2	10,8	,5	146
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población general	,2	,4	,6	3,9	,3	,7	12,7	1,5	1032
	Población gitana (IC95%)	4,3 (1,8-8,6)	2,2 (0,6-5,6)	2,3 (0,6-5,6)	1,8 (0,6-5,6)	1,3 (0,3-4,5)	2,2 (0,5-5,6)	13,1 (8,6-19,9)	10,1 (5,8-15,7)	138
De 25 a 34 años	Clase I	,0	3,4	,0	1,5	2,4	,5	10,1	,9	148
	Clase II	1,1	2,5	,3	2,5	,9	1,1	18,7	,8	160
	Clase III	1,1	,9	,4	2,4	,1	,1	13,4	3,1	403
	Clase IVa	2,3	1,4	,8	3,1	,7	,5	10,3	2,8	522
	Clase IVb	1,3	1,3	2,0	4,1	,0	,2	9,0	2,2	248
	Clase V	4,1	3,8	,5	6,7	,6	,0	15,7	3,8	172
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Población general	1,7	2,0	,7	3,2	,7	,4	12,3	2,5	1681
	Población gitana (IC95%)	3,5 (1,4-7,8)	2,7 (0,9-6,8)	1,1 (0,3-4,6)	6,5 (3,2-11,6)	,3 (0,0-1,8)	4,7 (2,3-9,7)	14,0 (8,7-20,3)	8,8 (4,8-14,3)	140
De 35 a 54 años	Clase I	4,1	3,3	,6	1,7	1,3	1,5	11,7	3,7	383
	Clase II	5,6	6,7	,9	2,2	1,2	1,9	10,4	3,9	436
	Clase III	6,0	6,0	2,0	3,7	1,5	1,1	11,5	6,3	922
	Clase IVa	9,8	6,1	2,4	5,1	1,1	2,2	9,5	9,4	981
	Clase IVb	7,3	8,0	3,5	4,0	2,1	3,6	8,7	10,3	498
	Clase V	8,9	9,2	3,6	3,9	2,3	,8	8,3	10,9	411
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Población general	7,4	6,5	2,2	3,7	1,5	1,9	10,1	7,7	3679
	Población gitana (IC95%)	21,1 (15,5-28,0)	15,4 (10,3-21,3)	7,8 (4,4-12,8)	6,9 (3,5-11,3)	5,4 (2,7-9,8)	11,5 (7,3-17,1)	20,4 (14,9-27,3)	20,1 (14,4-26,6)	167
De 55 y más años	Clase I	27,9	26,0	11,9	5,4	14,8	1,0	11,6	7,2	246
	Clase II	34,6	17,4	11,9	6,8	12,5	2,3	11,7	11,1	327
	Clase III	38,7	26,9	12,8	8,6	13,5	3,3	8,5	13,8	1592
	Clase IVa	42,5	25,6	15,5	8,0	16,3	4,9	11,9	12,6	1447
	Clase IVb	40,6	25,3	18,2	10,6	12,6	4,4	9,3	13,7	750
	Clase V	44,1	26,6	20,0	10,4	19,5	6,8	9,8	15,6	909
	Otros	41,8	18,9	14,9	,3	17,4	2,2	6,1	9,9	53
	No consta	49,0	10,2	24,0	2,8	20,2	9,5	12,1	14,1	59
	Población general	40,0	25,3	15,4	8,5	15,2	4,3	10,2	13,1	5383
	Población gitana (IC95%)	50,2 (40,1-61,0)	34,5 (25,1-44,9)	18,7 (11,3-27,5)	20,3 (13,2-30,1)	19,8 (12,2-28,8)	14,1 (7,7-22,2)	17,8 (10,4-26,2)	38,9 (29,3-49,6)	81

Tabla 2.2b. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas, dolor de cabeza	Mala circulación	Hernias	Artrosis y problemas reumáticos	Osteoporosis	Problemas del período menopausico	Total
		%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
De 16 a 24 años	Clase I	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	70
	Clase II	,8	1,0	3,1	,0	,2	,0	,0	90
	Clase III	1,4	5,2	1,4	,3	,5	,0	,0	220
	Clase IVa	1,0	5,8	1,7	,9	2,8	,0	,7	330
	Clase IVb	,7	4,2	2,2	,0	1,9	,0	,8	154
	Clase V	,2	3,3	4,2	,0	,3	,0	,0	146
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	9
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población general	1,0	4,1	2,0	,4	1,3	,1	,4	1032
Población gitana (IC95%)	3,2 (1,3-7,6)	29,1 (22,0-37,0)	8,8 (4,7-14,0)	1,7 (0,3-4,5)	3,5 (1,3-7,6)	,0 (0,0-1,8)	1,0 (0,0-3,3)	138	
De 25 a 34 años	Clase I	2,4	5,0	2,4	1,4	,5	,0	,0	148
	Clase II	1,0	4,6	5,9	1,2	1,5	,2	,0	160
	Clase III	1,2	6,3	4,8	1,7	,5	,0	,0	403
	Clase IVa	2,0	8,4	5,8	1,9	3,1	,0	,1	522
	Clase IVb	,7	6,3	6,4	,3	2,5	,8	,0	248
	Clase V	3,5	5,6	6,0	1,5	2,3	,0	,0	172
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	13
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	15
	Población general	1,7	6,5	5,3	1,5	1,9	,1	,0	1681
Población gitana (IC95%)	3,1 (0,9-6,8)	24,5 (18,0-32,3)	14,5 (9,3-21,1)	3,7 (1,4-7,8)	6,5 (3,2-11,6)	,0 (0,0-1,8)	2,7 (0,9-6,8)	140	
De 35 a 54 años	Clase I	1,1	7,7	6,6	2,0	6,1	1,4	4,1	383
	Clase II	,7	9,0	8,4	4,1	7,8	3,2	4,4	436
	Clase III	1,5	8,9	10,5	5,3	15,0	2,9	5,0	922
	Clase IVa	1,0	11,8	11,8	5,6	14,0	3,4	5,7	981
	Clase IVb	1,7	10,7	11,7	4,4	12,5	2,4	4,1	498
	Clase V	2,7	14,6	13,9	4,0	17,3	3,8	3,3	411
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	20
	Población general	1,4	10,5	10,8	4,6	12,9	3,0	4,7	3679
Población gitana (IC95%)	8,5 (4,9-13,5)	47,7 (40,3-55,5)	31,7 (25,3-39,6)	9,8 (5,8-15,0)	22,3 (16,5-29,3)	6,8 (3,5-11,3)	11,8 (7,3-17,1)	167	
De 55 y más años	Clase I	2,2	7,4	18,8	7,0	36,0	19,5	2,5	246
	Clase II	2,4	7,8	24,8	8,7	45,6	20,0	4,2	327
	Clase III	4,0	9,9	29,7	9,0	50,7	18,5	2,9	1592
	Clase IVa	2,7	12,6	34,0	8,8	52,0	17,5	3,7	1447
	Clase IVb	2,0	11,7	33,9	7,5	52,3	16,6	2,8	750
	Clase V	2,8	11,1	37,5	9,9	57,0	22,0	2,6	909
	Otros	7,5	8,6	26,2	8,6	45,7	17,1	4,2	53
	No consta	14,1	22,9	19,4	6,7	60,2	16,7	3,2	59
	Población general	3,1	10,9	31,6	8,7	51,0	18,7	3,2	5383
Población gitana (IC95%)	9,9 (4,2-18,1)	50,0 (39,0-59,9)	51,6 (41,3-62,1)	25,1 (17,0-35,2)	62,2 (51,6-75,5)	27,3 (19,0-37,6)	19,1 (12,2-28,8)	81	

Tabla 2.2c. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

Edad		Hipertensión arterial	Coolesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza	Hernias	Total N (no ponderado)	
Edad		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
De 0 a 4	Clase I	,0	,0	,0	,3	2,3	,0	2,8	,0	,0	,0	,0	79	
	Clase II	,0	,0	,0	6,2	,0	,0	2,3	,0	,0	,0	,0	105	
	Clase III	,0	,0	,0	2,5	,1	,0	6,0	,0	,7	,0	,4	170	
	Clase IVa	,0	,0	,0	3,6	,2	,0	4,5	,0	2,1	,0	,8	267	
	Clase IVb	,0	,0	,0	9,0	,8	,0	4,6	,0	,0	,0	,0	125	
	Clase V	,0	,0	,0	7,0	,0	,0	6,2	,0	,0	,6	2,2	105	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	,0	,1	,0	4,7	,4	,0	4,5	,0	,8	,1	,6	,6	866
	Población gitana	,0 (0,0-3,2)	,0 (0,0-3,2)	,0 (0,0-3,2)	17,6 (10,5-27,3)	,6 (0,1-5,8)	,0 (0,0-3,2)	6,4 (2,4-13,4)	,0 (0,0-3,2)	,0 (0,0-3,2)	,0 (0,0-3,2)	,0 (0,0-3,2)	,0 (0,0-3,2)	80
De 5 a 9	Clase I	,0	,0	,0	10,1	1,0	,0	4,4	,0	1,0	1,1	,0	94	
	Clase II	1,0	,0	,0	5,3	,0	,0	10,3	,0	,3	,0	,0	106	
	Clase III	,5	,0	,6	3,6	,9	,0	5,8	,7	1,1	,5	,2	215	
	Clase IVa	,0	,7	,0	4,7	,3	,0	8,2	,1	,0	,4	,0	259	
	Clase IVb	,0	,0	,1	5,5	1,5	,0	13,5	,0	,7	,5	,0	128	
	Clase V	,0	,0	,0	1,9	,0	,0	14,8	,0	,0	,8	,0	92	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	Población General	,2	,2	,1	5,0	,6	,0	9,0	,2	,5	,5	,0	,0	898
	Población gitana	1,3 (0,1-6,3)	1,3 (0,1-6,3)	,0 (0,0-3,4)	18,8 (11,4-29,3)	,7 (0,1-6,3)	,0 (0,0-3,4)	11,7 (5,3-19,7)	,0 (0,0-3,4)	1,3 (0,1-6,3)	5,3 (1,8-12,5)	,8 (0,1-6,3)	,8 (0,1-6,3)	76
De 10 a 15	Clase I	,0	,2	,0	6,4	,0	,0	11,6	,0	,0	2,0	,0	130	
	Clase II	,0	1,1	,0	5,2	,0	,0	14,9	,4	1,3	2,7	,0	166	
	Clase III	,7	,1	,7	5,9	,4	,0	18,1	,0	,9	2,6	,2	372	
	Clase IVa	,0	2,1	,3	5,7	,8	,0	13,4	,1	,3	1,1	,6	476	
	Clase IVb	,0	2,1	,5	5,5	1,3	,0	11,4	,7	3,3	3,3	,2	195	
	Clase V	,0	,1	,0	8,4	,7	,0	16,2	,5	1,1	1,6	,0	185	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	Población General	,2	1,0	,4	6,1	,6	,0	14,6	,2	1,0	2,0	,2	,2	1543
	Población gitana	1,2 (0,1-4,3)	2,3 (0,3-5,9)	,9 (0,1-4,3)	6,5 (2,9-12,3)	,9 (0,1-4,3)	,9 (0,1-4,3)	12,9 (7,6-20,3)	1,8 (0,3-5,9)	3,6 (1,2-8,6)	5,2 (2,3-11,1)	,0 (0,0-2,3)	,0 (0,0-2,3)	108

Tabla 2.2d. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Hipertensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza	Hernias	Total N (no ponderado)	
EDAD		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
De 0 a 4	Clase I	,0	,0	,0	,8	,7	,0	4,6	,0	1,0	,0	,0	82	
	Clase II	,0	,7	,0	,2	,0	,0	,2	,0	,0	,0	,2	105	
	Clase III	,0	,0	,0	1,3	,0	,0	3,6	,0	1,2	,0	,0	198	
	Clase IVa	,0	,5	,0	2,7	1,9	,0	3,2	,0	,0	,0	,4	234	
	Clase IVb	,0	,0	,0	,1	,2	,0	3,4	,0	,7	,0	,0	103	
	Clase V	,0	,0	,0	6,8	,0	,7	4,4	,0	,6	,0	,0	93	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Población General	,0	,2	,0	2,2	,6	,1	3,2	,0	,5	,0	,1		828
	Población gitana (IC95%)	,0 (0,0-3,6)	,0 (0,0-3,6)	1,3 (0,1-6,5)	7,7 (2,7-15,0)	2,2 (0,6-8,9)	,0 (0,0-3,6)	7,7 (2,7-15,0)	,0 (0,0-3,6)	,0 (0,0-3,6)	,0 (0,0-3,6)	,0 (0,0-3,6)	2,2 (0,6-8,9)	67
De 5 a 9	Clase I	,0	1,3	,0	3,1	,0	,0	4,6	,0	,0	,0	,0	96	
	Clase II	,0	,8	,0	,2	2,6	,0	3,0	,0	1,0	,9	,0	97	
	Clase III	,0	,0	,0	3,3	,7	,0	6,9	,0	,0	,7	,0	203	
	Clase IVa	,3	1,3	,0	3,0	1,2	,0	9,0	,0	,0	1,2	,3	264	
	Clase IVb	,0	,0	,0	6,1	2,5	,0	11,0	,0	,2	,0	,0	123	
	Clase V	,0	,0	,0	9,8	,0	,0	10,1	,5	,0	,3	,8	86	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	Población General	,1	,6	,0	3,9	1,1	,0	7,5	,0	,1	,6	,2		881
	Población gitana	1,2 (0,1-5,9)	2,4 (0,5-8,0)	,0 (0,0-3,2)	7,3 (3,2-15,2)	,7 (0,1-5,9)	,0 (0,0-3,2)	8,7 (4,1-16,9)	1,2 (0,1-5,9)	2,4 (0,5-8,0)	5,0 (1,7-11,8)	,6 (0,0-3,2)		78
De 10 a 15	Clase I	,0	,0	,0	2,2	,0	,0	10,1	,0	,0	,4	,0	112	
	Clase II	,0	,0	,0	2,6	,9	,0	9,8	,0	,9	1,3	,0	164	
	Clase III	,9	1,4	,1	5,0	,4	,0	12,2	,0	,0	3,1	,0	325	
	Clase IVa	,2	1,0	,6	4,9	,9	,0	13,8	,6	,2	6,4	,0	452	
	Clase IVb	,1	,3	,3	5,6	,2	,1	14,4	,3	,1	4,5	,1	201	
	Clase V	,4	,3	,0	1,1	1,2	,0	8,5	,0	1,1	3,4	,0	175	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	Población General	,3	,7	,3	4,0	,7	,0	12,2	,2	,3	3,9	,0		1447
	Población gitana	,4 (0,0-2,8)	2,6 (0,4-7,1)	1,0 (0,1-5,2)	8,8 (4,3-16,3)	1,6 (0,1-5,2)	,0 (0,0-2,8)	15,0 (8,4-23,1)	,5 (0,0-2,8)	1,7 (0,4-7,1)	12,8 (6,7-20,4)	1,1 (0,1-5,2)		93

En las siguientes tablas se muestran los datos de prevalencia de las distintas enfermedades estudiadas. En la 2.3a y 2.3b se muestran los resultados brutos y en las siguientes (2.3c a 2.3p) las *odds ratio* ajustadas obtenidas a partir de modelos de regresión logística. Se observan las siguientes pautas:

Los problemas estudiados aumentan su frecuencia con la edad a excepción de la alergia, la úlcera de estómago, la depresión y las jaquecas en hombres. En el caso de las mujeres la excepción se encuentra en “otras enfermedades mentales”. Tanto en hombres como en mujeres la frecuencia del asma, bronquitis o enfisema no se relaciona con la edad.

El nivel educativo resulta un factor protector en el caso de la hipertensión y del asma, en hombres y mujeres.

Para varios de los problemas estudiados residir en infravivienda o chabolas incrementa la prevalencia. Esto ocurre en el caso de las mujeres con la hipertensión arterial, el asma y la enfermedad del corazón y en los hombres en el caso de las hernias, la depresión y otras enfermedades mentales.

Resumen

- Se observa un deterioro con la edad más rápido en la población gitana que en la población general.
- Residir en infravivienda o chabolas incrementa la prevalencia de algunas enfermedades. Esto ocurre en el caso de las mujeres con la hipertensión arterial, el asma y la enfermedad del corazón y en los hombres en el caso de las hernias, la depresión y otras enfermedades mentales.
- El nivel educativo protege frente al asma y la hipertensión.

Tabla 2.3a. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hipertensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
Grupos de edad	De 16 a 24 años	2,4	1,4	,3	8,9	,0	6,0	15,6	3,2	151	
	De 25 a 34 años	5,3	10,3	1,6	9,0	,0	8,2	12,7	6,6	97	
	De 35 a 54 años	17,1	20,6	5,2	4,7	4,2	10,2	11,9	11,4	152	
	De 55 y más años	40,6	30,8	19,1	25,3	19,1	18,1	9,6	9,1	66	
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	32,6	14,0	11,7	32,2	15,7	12,3	9,9	12,9	40	
	Leer y escribir /primarios incompletos	15,7	14,9	5,7	7,3	4,7	11,0	10,6	7,8	242	
	Primarios completos	11,7	16,8	2,5	6,8	,8	9,1	9,9	8,1	86	
	Secundarios o superiores	1,6	8,0	2,3	6,7	1,0	5,6	21,5	4,2	82	
	Total	13,6	13,8	4,9	9,2	4,1	9,7	12,6	7,6	450	
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	12,9	17,5	2,2	1,8	4,1	1,8	13,2	3,1	48	
	Trab. cuenta ajena Temporal	11,7	11,2	5,2	5,5	,4	13,5	13,7	8,6	98	
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	6,4	15,1	2,9	5,0	3,6	9,4	13,6	3,8	81	
	Ayuda familiar	10,7	5,5	,0	9,1	,0	10,3	6,3	2,8	46	
	Parado ha trabajado antes	11,8	15,8	3,7	8,5	1,9	10,0	13,2	7,8	82	
	Parado busca primer empleo	1,7	1,7	1,7	14,3	,0	3,4	17,9	10,6	32	
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Jubilado	35,7	23,4	15,0	26,5	18,1	12,7	9,9	16,3	68	
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Total	13,1	13,6	4,7	9,7	4,0	9,5	12,9	7,5	466	
Tipo de vivienda	Normalizada	12,9	14,1	4,5	9,1	3,9	9,0	13,2	6,7	426	
	Infravivienda/chabola	14,8	7,9	6,4	16,2	3,9	14,7	9,3	16,1	39	
	Total	13,1	13,6	4,6	9,6	3,9	9,4	12,9	7,5	465	
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	12,3	13,9	4,6	9,5	4,1	8,8	13,4	7,4	422	
	No	21,7	10,7	4,6	11,5	1,2	15,8	7,1	7,6	43	
	Total	13,1	13,6	4,6	9,6	3,9	9,4	12,9	7,5	465	
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	12,0	12,9	4,7	9,7	4,8	7,4	13,9	5,7	327	
	Integrado y malas condiciones	9,9	13,8	2,4	8,0	2,5	13,2	6,1	17,0	54	
	Alejado y buenas condiciones	18,1	19,6	5,2	6,1	1,9	15,1	14,8	11,0	52	
	Alejado y malas condiciones	22,5	11,8	6,8	17,0	,0	15,2	10,5	4,4	32	
	Total	13,1	13,6	4,6	9,6	3,9	9,4	12,9	7,5	465	

Tabla 2.3a. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas, dolor de cabeza	Mala circulación	Hernias	Artrosis y problemas reumáticos	Osteoporosis	Próstata	Total
		%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	1,7	18,0	1,1	1,1	3,3	,0	,0	151
	De 25 a 34 años	2,1	17,2	3,7	3,4	6,9	,9	,0	97
	De 35 a 54 años	7,9	24,9	10,0	12,0	8,7	1,0	3,1	152
	De 55 y más años	8,6	22,2	41,3	17,6	36,0	9,4	24,3	66
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	9,7	28,1	29,2	17,2	23,4	4,8	11,5	40
	Leer y escribir /primarios incompletos	4,9	24,0	10,8	6,6	11,5	1,7	4,6	242
	Primarios completos	7,1	18,2	9,4	7,4	5,9	1,8	5,0	86
	Secundarios o superiores	1,1	12,7	1,0	5,8	6,7	,0	1,0	82
	Total	5,0	21,0	10,2	7,5	10,5	1,6	4,5	450
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	3,8	17,3	7,3	7,3	8,7	1,8	,0	48
	Trab. cuenta ajena Temporal	6,9	19,1	6,9	8,6	4,8	,0	2,5	98
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	1,3	22,7	4,7	5,7	5,0	,0	1,9	81
	Ayuda familiar	1,3	11,3	2,6	,0	6,5	2,8	,0	46
	Parado ha trabajado antes	1,2	26,1	7,6	6,8	8,1	1,2	6,1	82
	Parado busca primer empleo	8,9	15,2	,0	,0	4,8	,0	,0	32
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	10
	Jubilado	12,8	26,9	38,8	18,2	34,9	8,5	17,1	68
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	4,8	20,7	10,0	7,4	10,3	1,8	4,4	466	
Tipo de vivienda	Normalizada	3,8	20,1	9,5	6,5	10,6	1,7	4,1	426
	Infravivienda/chabola	14,8	26,6	14,5	17,4	6,6	2,7	7,0	39
Total	4,7	20,6	9,9	7,4	10,3	1,8	4,4	465	
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	4,3	20,7	10,1	7,5	10,0	2,0	4,5	422
	No	8,6	20,0	8,3	5,4	13,2	,0	2,8	43
	Total	4,7	20,6	9,9	7,4	10,3	1,8	4,4	465
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	3,6	18,8	9,1	6,6	9,8	1,7	4,0	327
	Integrado y malas condiciones	7,4	21,8	15,4	5,8	10,6	3,2	4,3	54
	Alejado y buenas condiciones	10,5	29,8	11,8	11,2	13,8	,0	9,5	52
	Alejado y malas condiciones	2,7	24,0	7,1	11,8	9,2	3,0	,0	32
	Total	4,7	20,6	9,9	7,4	10,3	1,8	4,4	465

Tabla 2.3b. Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hipertensión arterial	Colesterol elevado	Diabetes	Asma, bronquitis crónica, enfisema	Enfermedad del corazón	Úlcera de estómago	Alergia	Depresión	Total
		%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	4,3	2,2	2,3	1,8	1,3	2,2	13,1	10,1	138
	De 25 a 34 años	3,5	2,7	1,1	6,5	,3	4,7	14,0	8,8	140
	De 35 a 54 años	21,1	15,4	7,8	6,9	5,4	11,5	20,4	20,1	168
	De 55 y más años	50,2	34,5	18,7	20,3	19,8	14,1	17,8	38,9	81
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	45,0	26,4	19,2	20,7	19,1	11,4	13,8	29,9	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	16,3	12,5	5,5	6,6	3,6	7,3	15,7	19,5	282
	Primarios completos	6,4	3,4	2,3	3,8	2,7	6,0	17,5	9,7	73
	Secundarios o superiores	1,2	2,6	1,4	3,1	1,2	6,1	20,7	7,3	70
	Total	17,2	11,9	6,6	7,9	5,6	7,6	16,4	17,9	509
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	9,8	15,5	4,5	2,2	3,5	2,8	15,8	19,9	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	8,1	2,6	1,2	3,4	2,0	10,4	25,5	12,8	82
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	27,9	8,1	4,6	5,0	14,1	13,6	21,6	15,2	42
	Ayuda familiar	16,2	11,5	7,1	12,3	4,3	6,0	7,7	15,7	37
	Parado ha trabajado antes	10,9	4,9	1,8	5,1	1,4	9,2	19,9	14,6	55
	Parado busca primer empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Jubilado	40,3	30,4	20,8	18,7	19,2	18,2	17,8	34,1	66
	Labores del hogar	15,7	12,6	6,7	8,6	2,7	2,5	10,4	16,3	173
	Total	16,8	11,7	6,4	7,6	5,4	7,7	16,4	17,6	527
Tipo de vivienda	Normalizada	15,8	11,0	5,8	6,8	4,3	7,3	16,6	17,2	486
	Infravivienda/chabola	35,4	24,8	16,4	22,0	23,0	11,0	15,4	21,9	37
	Total	17,0	11,9	6,4	7,7	5,4	7,5	16,6	17,5	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	16,7	11,4	6,1	8,1	5,1	7,6	17,5	17,2	476
	No	21,3	17,6	11,3	2,4	9,7	6,2	4,8	21,0	47
	Total	17,0	11,9	6,4	7,7	5,4	7,5	16,6	17,5	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	17,9	10,7	6,4	8,3	4,8	7,1	16,7	19,4	377
	Integrado y malas condiciones	12,4	13,6	7,9	6,7	7,4	4,9	15,9	12,5	58
	Alejado y buenas condiciones	11,9	12,5	1,9	8,1	6,8	14,6	22,2	7,1	49
	Alejado y malas condiciones	21,5	20,6	10,6	2,5	6,6	6,7	9,2	18,8	39
	Total	17,0	11,9	6,4	7,7	5,4	7,5	16,6	17,5	523

Tabla 2.3b. (cont.) Problemas de salud o enfermedades crónicas. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Otras enfermedades mentales	Jaquecas, migrañas, dolor de cabeza	Mala circulación	Hernias	Artrosis y problemas reumáticos	Osteoporosis	Problemas periodo menopausico	Total
		%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	3,2	29,1	8,8	1,7	3,5	,0	1,0	138
	De 25 a 34 años	3,1	24,5	14,5	3,7	6,5	,0	2,7	140
	De 35 a 54 años	8,5	47,7	31,7	9,8	22,3	6,8	11,8	168
	De 55 y más años	9,9	50,0	51,6	25,1	62,2	27,3	19,1	81
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	12,0	54,9	44,0	18,4	51,1	17,7	15,5	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	5,9	37,8	24,5	8,5	18,8	6,8	7,5	282
	Primarios completos	5,6	21,8	13,8	4,8	5,6	2,1	5,3	73
	Secundarios o superiores	1,3	34,1	17,0	2,1	6,4	,0	5,0	70
	Total	6,2	37,6	24,9	8,6	20,2	6,8	8,1	509
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	5,7	36,7	13,0	8,4	8,6	5,7	9,4	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	6,0	27,9	27,4	5,5	15,9	2,8	4,2	82
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	2,1	29,4	28,0	15,5	22,5	8,1	12,6	42
	Ayuda familiar	7,2	37,5	20,4	4,3	11,5	6,0	20,5	37
	Parado ha trabajado antes	4,9	36,9	18,1	6,3	14,3	1,7	3,9	55
	Parado busca primer empleo	-	-	-	-	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	11
	Jubilado	14,3	53,9	45,8	22,9	51,7	22,4	16,2	66
	Labores del hogar	4,0	40,5	20,8	5,6	17,7	5,3	4,9	173
Total	5,9	37,1	24,4	8,6	19,7	6,6	7,8	527	
Tipo de vivienda	Normalizada	5,8	36,6	23,5	8,5	18,8	6,3	8,4	486
	Infravivienda/chabola	9,9	46,3	37,2	10,8	32,6	12,1	,0	37
	Total	6,0	37,2	24,4	8,7	19,6	6,7	7,9	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	6,0	37,5	24,5	8,5	19,5	6,6	8,5	476
	No	6,4	33,1	23,2	10,1	20,8	7,8	,0	47
	Total	6,0	37,2	24,4	8,7	19,6	6,7	7,9	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	5,7	37,5	24,2	8,7	19,8	6,7	9,5	377
	Integrado y malas condiciones	9,3	32,1	16,8	6,7	11,6	,0	3,8	58
	Alejado y buenas condiciones	5,9	38,6	34,4	10,9	25,3	11,7	2,0	49
	Alejado y malas condiciones	4,2	40,6	24,9	8,4	23,2	9,8	5,6	39
	Total	6,0	37,2	24,4	8,7	19,6	6,7	7,9	523

Tabla 2.3c. Hipertensión arterial. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Hipertensión arterial) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,942	,924	,960	,000	,946	,930	,963
Educación	No sabe leer y escribir	,147				,012			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,334	1,552	,636	3,784	,036	1,934	1,043	3,588
	Primarios completos	,449	1,533	,508	4,629	,014	3,965	1,326	11,857
	Secundarios o superiores	,021	9,540	1,410	64,558	,015	14,803	1,688	129,846
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,991	,994	,327	3,022	,030	,360	,143	,907

Tabla 2.3d. Colesterol elevado. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Colesterol Elevado) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,950	,933	,968	,000	,949	,932	,967
Educación	No sabe leer y escribir	,331				,260			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,276	,551	,189	1,611	,812	1,089	,541	2,190
	Primarios completos	,086	,344	,102	1,164	,106	3,225	,780	13,337
	Secundarios o superiores	,436	,584	,151	2,260	,215	2,768	,554	13,821
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,646	1,359	,367	5,028	,068	,405	,153	1,069

Tabla 2.3e. Diabetes. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (diabetes) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				IC <i>ODDS RATIO</i> 95%				IC <i>ODDS RATIO</i> 95%	
		SIG.	<i>ODDS RATIO</i> AJUSTADA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	SIG.	<i>ODDS RATIO</i> AJUSTADA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Edad		,000	,932	,906	,959	,001	,962	,941	,985
Educación	No sabe leer y escribir	,975				,167			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,929	1,059	,301	3,725	,076	2,142	,923	4,972
	Primarios completos	,683	1,471	,230	9,392	,105	4,075	,744	22,312
	Secundarios o superiores	,992	1,010	,146	6,993	,137	4,998	,599	41,694
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,556	,625	,131	2,989	,104	,399	,132	1,206

Tabla 2.3f. Asma, bronquitis crónica, enfisema. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Asma, bronquitis crónica, enfisema) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Limite inferior	Limite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Limite inferior	Limite superior
Edad	de 16 a 24 años	,022				,046			
	de 25 a 34 años	,967	1,021	,385	2,708	,098	,293	,068	1,255
	de 35 a 54 años	,166	2,081	,739	5,859	,095	,289	,067	1,240
	de 55 y más años	,092	,429	,160	1,149	,008	,132	,029	,591
Educación	no sabe leer y escribir	,009				,203			
	leer y escribir /primarios incompletos	,001	4,718	1,879	11,845	,048	2,270	1,009	5,110
	primarios completos	,014	4,509	1,358	14,975	,130	2,957	,728	12,018
	secundarios o superiores	,012	4,864	1,416	16,707	,223	2,675	,550	13,013
Tipo de vivienda	infravivienda/chabola	,843	1,126	,348	3,649	,020	,306	,113	,831

Tabla 2.3g. Enfermedad del corazón. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (enfermedad del corazón) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,903	,869	,938	,000	,951	,926	,976
Educación	No sabe leer y escribir	,556				,160			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,316	1,901	,542	6,674	,027	2,886	1,128	7,386
	Primarios completos	,201	5,934	,386	91,201	,302	2,372	,460	12,226
	Secundarios o superiores	,477	2,466	,205	29,727	,285	3,525	,349	35,567
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,886	1,154	,162	8,219	,001	,152	,051	,455

Tabla 2.3h. Úlcera de estómago. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Úlcera de estómago) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,174	,986	,967	1,006	,000	,953	,932	,975
Educación	No sabe leer y escribir	,799				,681			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,804	,869	,286	2,638	,629	,796	,315	2,011
	Primarios completos	,902	,920	,245	3,459	,497	,633	,169	2,368
	Secundarios o superiores	,613	1,457	,339	6,268	,239	,431	,106	1,752
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,250	,544	,193	1,536	,410	,594	,172	2,052

Tabla 2.3i. Alergia. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (alergia) (1=no : 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,663	1,004	,985	1,025	,043	,983	,967	,999
Educación	No sabe leer y escribir	,102				,252			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,953	1,036	,320	3,359	,262	,643	,297	1,391
	Primarios completos	,854	1,134	,296	4,341	,181	,519	,199	1,355
	Secundarios o superiores	,243	,466	,129	1,681	,051	,374	,139	1,006
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,708	1,256	,380	4,146	,900	,937	,340	2,581

Tabla 2.3j. Depresión. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (depresión) (1=no : 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,102	,982	,960	1,004	,000	,965	,950	,980
Educación	No sabe leer y escribir	,822				,343			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,867	1,102	,351	3,458	,943	1,023	,542	1,931
	Primarios completos	,827	,857	,216	3,402	,222	1,836	,692	4,872
	Secundarios o superiores	,557	1,604	,332	7,755	,232	1,957	,651	5,881
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,050	,349	,122	1,000	,739	,853	,336	2,171

Tabla 2.3k. Otras enfermedades mentales. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (otras enfermedades mentales) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,040	,972	,946	,999	,188	,984	,961	1,008
Educación	No sabe leer y escribir	,262				,408			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,992	1,007	,258	3,934	,307	1,625	,640	4,122
	Primarios completos	,311	,431	,085	2,192	,500	1,573	,422	5,863
	Secundarios o superiores	,425	2,712	,233	31,534	,101	6,337	,696	57,682
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,005	,177	,053	,589	,565	,691	,196	2,437

Tabla 2.3l. Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Jaquecas, migrañas o dolores de cabeza) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,991	1,000	,985	1,015	,031	,986	,973	,999
Educación	No sabe leer y escribir	,172				,036			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,681	1,183	,531	2,640	,168	1,472	,850	2,550
	Primarios completos	,315	1,633	,627	4,253	,004	3,008	1,412	6,408
	Secundarios o superiores	,077	2,528	,903	7,076	,319	1,462	,693	3,083
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,577	,794	,352	1,790	,461	,753	,354	1,601

Tabla 2.3m. Mala circulación. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Mala circulación) (1=no ; 0= si)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,930	,909	,951	,000	,952	,937	,967
Educación	No sabe leer y escribir	,218				,572			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,253	1,756	,669	4,605	,923	1,030	,565	1,877
	Primarios completos	,798	1,173	,347	3,963	,287	1,609	,670	3,866
	Secundarios o superiores	,065	8,707	,871	87,079	,753	,868	,359	2,098
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,410	,606	,184	1,994	,120	,511	,219	1,190

Tabla 2.3n. Hernias. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Hernias) (1=no ; 0= si)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,952	,931	,974	,000	,950	,930	,970
Educación	No sabe leer y escribir	,541				,786			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,592	1,350	,450	4,051	,848	1,080	,489	2,388
	Primarios completos	,627	,713	,181	2,799	,576	1,454	,392	5,394
	Secundarios o superiores	,639	,704	,163	3,039	,356	2,346	,384	14,344
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,011	,238	,079	,715	,912	,932	,264	3,286

Tabla 2.3ñ. Artrosis y problemas reumáticos. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Artrosis y problemas reumáticos) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,951	,933	,970	,000	,927	,910	,945
Educación	No sabe leer y escribir	,514				,092			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,287	1,684	,646	4,390	,153	1,587	,842	2,991
	Primarios completos	,135	2,673	,737	9,695	,014	4,365	1,352	14,098
	Secundarios o superiores	,469	1,613	,443	5,874	,240	1,994	,631	6,303
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,328	2,055	,485	8,702	,155	,483	,177	1,318

Tabla 2.3o. Osteoporosis. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Osteoporosis) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,011	,943	,902	,987	,000	,929	,906	,953
Educación	No sabe leer y escribir	,935				,869			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,680	1,496	,221	10,127	,984	,992	,424	2,319
	Primarios completos	,891	,841	,071	9,907	,430	2,063	,342	12,450
	Secundarios o superiores	,997	-	-	-	,997	-	-	-
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,616	,548	,052	5,747	,485	,630	,173	2,298

Tabla 2.3p. Próstata (hombres) y problemas período menopáusico (mujeres). Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable Y (Próstata en hombres y problemas período menopáusico en mujeres) (1=no ; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,897	,864	,932	,000	,954	,934	,975
Educación	No sabe leer y escribir	,378				,963			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,859	,883	,222	3,503	,715	1,171	,502	2,729
	Primarios completos	,151	,270	,045	1,611	,680	1,313	,360	4,787
	Secundarios o superiores	,988	,980	,074	13,036	,999	,999	,248	4,030
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,177	,312	,058	1,692	,998	-	-	-

Limitación de la actividad principal

Una de las consecuencias de la mayor morbilidad en la población gitana es la limitación de la actividad principal. En los datos agregados, a pesar de la mayor juventud de la población gitana, se observa que los hombres y mujeres adultos de la población gitana han reducido o limitado su actividad principal en las dos últimas semanas con mayor frecuencia que la población general.

Tabla 2.4a. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

	Durante las dos últimas semanas, ¿ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudio, labores del hogar, etc.) Por alguno o varios dolores o síntomas?					
	Hombres			Mujeres		
	Si	No	Total	Si	No	Total
	%	%	No (ponderado)	%	%	No (ponderado)
Clase I	7,4	92,6	689	10,8	89,2	847
Clase II	10,8	89,2	962	12,0	88,0	1013
Clase III	11,4	88,6	2612	14,8	85,2	3137
Clase IVa	11,8	88,2	3113	17,2	82,8	3280
Clase IVb	10,2	89,8	1190	17,4	82,6	1650
Clase V	11,5	88,5	1172	17,2	82,8	1638
Otros	8,2	91,8	101	10,7	89,3	103
No consta	5,9	94,1	36	13,5	86,5	107
Población General (IC95%)	11,0 (10,3-11,6)	89,0 (88,4-89,7)	9875	15,5 (14,8-16,3)	84,5 (83,7-85,2)	11775
Población gitana (IC95%)	17,1 (13,8-20,7)	82,9 (79,3-86,2)	466	28,3 (24,5-32,2)	71,7 (67,8-75,5)	527

Tabla 2.4b. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 1 a 15 años. Porcentajes ponderados.**

	Niños				Niñas			
	Durante las dos últimas semanas, ¿ha tenido el niño/a que reducir o limitar su actividad principal (asistencia al centro de estudios guardería, etc.) Y/o las actividades que realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.)							
	Sí	No	Total		Sí	No	Total	
	%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)
Clase I	13,7	86,3	100	288	15,6	84,4	100	271
Clase II	11,9	88,1	100	362	13,7	86,3	100	348
Clase III	12,8	87,2	100	721	11,4	88,6	100	685
Clase IVa	11,0	89,0	100	950	14,5	85,5	100	904
Clase IVb	15,5	84,5	100	424	12,2	87,8	100	411
Clase V	10,4	89,6	100	361	17,5	82,5	100	334
Otros	-	-	-	24	-	-	-	28
No consta	-	-	-	8	-	-	-	13
Población General	12,3	87,7	100	3138	13,9	86,1	100	2994
Población gitana (IC95%)	11,6 (8,1-16,0)	88,4 (84,0-91,9)	100	265	18,5 (13,8-23,7)	81,5 (76,3-86,2)	100	239

Resumen

- En los hombres y mujeres en la edad adulta de la población gitana es más frecuente haber limitado la actividad principal por problemas de salud.

Cuando se analiza la limitación de la actividad principal por grupos de edad, se observa en algunos grupos de edad y en ambos sexos que la población gitana presenta niveles de limitación de la actividad principal superiores a los observados en la población general. Este problema es mucho más frecuente en las mujeres gitanas que en los hombres gitanos, en todas las edades a partir de los 16 años.

Tabla 2.5a. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hombres			Mujeres		
		Durante las dos últimas semanas, ¿ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudio, labores del hogar, etc.) Por alguno o varios dolores o síntomas?					
		Sí	No	Total	Sí	No	Total
		%	%	N (no ponderado)	%	%	N (no ponderado)
De 16 a 24 años	Clase I	9,6	90,4	69	11,3	88,7	70
	Clase II	14,6	85,4	105	7,4	92,6	90
	Clase III	9,5	90,5	257	10,1	89,9	220
	Clase IVa	9,9	90,1	326	15,2	84,8	330
	Clase IVb	6,6	93,4	149	11,0	89,0	154
	Clase V	6,6	93,4	134	13,2	86,8	146
	Otros	-	-	12	-	-	9
	No consta	-	-	8	-	-	13
	Población General	9,2	90,8	1060	12,1	87,9	1032
Población gitana (IC95%)	12,6 (8,0-18,7)	87,4 (81,3-91,4)	151	17,5 (12,1-24,7)	82,5 (75,3-87,9)	138	
De 25 a 34 años	Clase I	3,9	96,1	110	8,9	91,1	148
	Clase II	13,2	86,8	165	6,9	93,1	160
	Clase III	9,2	90,8	366	8,0	92,0	403
	Clase IVa	8,7	91,3	485	11,3	88,7	522
	Clase IVb	6,6	93,4	220	12,0	88,0	248
	Clase V	6,1	93,9	192	8,9	91,1	172
	Otros	-	-	16	-	-	13
	No consta	-	-	5	-	-	15
	Población General	8,3	91,7	1559	9,6	90,4	1681
Población gitana (IC95%)	19,3 (12,2-27,6)	80,7 (72,5-87,8)	97	24,5 (18,0-32,3)	75,5 (67,7-82,0)	140	
De 35 a 54 años	Clase I	7,1	92,9	340	10,4	89,6	383
	Clase II	8,1	91,9	445	12,6	87,4	436
	Clase III	10,2	89,8	930	11,4	88,6	922
	Clase IVa	8,7	91,3	1151	14,7	85,3	981
	Clase IVb	10,8	89,2	432	13,5	86,5	498
	Clase V	11,9	88,1	407	14,1	85,9	411
	Otros	-	-	29	-	-	28
	No consta	-	-	13	-	-	20
	Población General	9,5	90,5	3747	12,9	87,1	3679
Población gitana (IC95%)	14,6 (9,7-20,9)	85,4 (79,1-90,3)	152	24,6 (18,6-31,7)	75,4 (68,3-81,4)	168	
De 55 y más años	Clase I	9,9	90,1	170	12,9	87,1	246
	Clase II	10,8	89,2	247	16,5	83,5	327
	Clase III	15,1	84,9	1059	22,4	77,6	1592
	Clase IVa	18,0	82,0	1151	24,4	75,6	1447
	Clase IVb	15,3	84,7	389	27,0	73,0	750
	Clase V	17,0	83,0	439	23,8	76,2	909
	Otros	9,5	90,5	44	17,0	83,0	53
	No consta	-	-	10	-	-	59
	Población General	15,6	84,4	3509	22,8	77,2	5383
Población gitana (IC95%)	30,3 (19,9-42,2)	69,7 (57,8-80,1)	66	58,6 (48,1-68,6)	41,4 (31,4-51,9)	81	

Tabla 2.5b. Limitación de la actividad principal. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.**Distribución porcentual. Población de 1 a 15 años. Porcentajes ponderados**

		Niños			Niñas		
		Durante las dos últimas semanas, ¿ha tenido el niño/a que reducir o limitar su actividad principal (asistencia al centro de estudios guardería, etc.) Y/o las actividades que realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, visitas, juegos, etc)					
		Sí	No	Total	Sí	No	Total
		%	%	N (no ponderado)	%	%	N (no ponderado)
De 0 a 4 años	Clase I	15,6	84,4	64	23,5	76,5	63
	Clase II	24,9	75,1	90	20,5	79,5	87
	Clase III	21,5	78,5	134	17,7	82,3	157
	Clase IVa	20,2	79,8	215	24,0	76,0	188
	Clase IVb	21,1	78,9	101	18,8	81,2	87
	Clase V	20,1	79,9	84	27,9	72,1	73
	Otros	-	-	6	-	-	6
	No consta	-	-	3	-	-	5
	Población General	20,7	79,3	697	21,9	78,1	666
Población gitana (IC95%)	14,5 (7,9-23,7)	85,5 (76,3-92,1)	78	14,9 (8,5-25,3)	85,1 (74,-91,5)	67	
De 5 a 9 años	Clase I	9,5	90,5	94	16,4	83,6	96
	Clase II	10,2	89,8	106	8,7	91,3	97
	Clase III	14,1	85,9	215	13,2	86,8	203
	Clase IVa	9,1	90,9	259	12,7	87,3	264
	Clase IVb	16,8	83,2	128	14,0	86,0	123
	Clase V	3,4	96,6	92	15,7	84,3	86
	Otros	-	-	2	-	-	7
	No consta	-	-	2	-	-	5
	Población General	10,9	89,1	898	13,6	86,4	881
Población gitana (IC95%)	15,4 (8,2-24,6)	84,6 (75,4-91,8)	77	17,3 (9,8-26,4)	82,7 (73,6-90,2)	78	
De 10 a 15 años	Clase I	15,9	84,1	130	9,8	90,2	112
	Clase II	5,7	94,3	166	13,2	86,8	164
	Clase III	8,7	91,3	372	6,8	93,2	325
	Clase IVa	7,6	92,4	476	11,3	88,7	452
	Clase IVb	10,8	89,2	195	8,3	91,7	201
	Clase V	10,3	89,7	185	13,9	86,1	175
	Otros	-	-	16	-	-	15
	No consta	-	-	3	-	-	3
	Población General	9,2	90,8	1543	10,2	89,8	1447
Población gitana (IC95%)	6,9 (2,9-12,3)	93,1 (87,7-91,1)	108	22,4 (14,4-31,3)	77,6 (68,7-85,6)	94	

Resumen

- La limitación de actividad principal por problemas de salud es más frecuente en las mujeres que en los hombres, también en la población gitana.
- La distancia entre la población gitana y la población general en niveles de limitación de la actividad principal se incrementa con la edad.

En la población gitana son las personas de más edad las que con mayor frecuencia se han visto obligadas a reducir o limitar su actividad principal en las dos últimas semanas debido a su salud y las que peores indicadores presentan en comparación con la población general. En el caso de las mujeres gitanas mayores de 55 años un 58,6% presenta este problema frente a un 22,8% en la población general.

La pauta de frecuencia de la limitación en la actividad principal según el tipo de vivienda en el que se habita difiere en los hombres y mujeres gitanas. Para las mujeres gitanas vivir en infravivienda o chabola aumenta la probabilidad de haber reducido la actividad principal.

Tabla 2.6a. Limitación de la actividad principal. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Hombres			Mujeres		
		Durante las dos últimas semanas, ¿ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudio, labores del hogar, etc.) Por alguno o varios dolores o síntomas?					
		Sí	No	Total	Sí	No	Total
		%	%	N (no ponderado)	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	12,6	87,4	151	17,5	82,5	138
	De 25 a 34 años	19,3	80,7	97	24,5	75,5	140
	De 35 a 54 años	14,6	85,4	152	24,6	75,4	168
	De 55 y más años	30,3	69,7	66	58,6	41,4	81
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	17,5	82,5	40	47,1	52,9	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	16,8	83,2	242	30,6	69,4	282
	Primarios completos	17,8	82,2	86	17,8	82,2	73
	Secundarios o superiores	16,2	83,8	82	14,7	85,3	70
	Total	16,9	83,1	450	29,0	71,0	509
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo/a	20,9	79,1	48	25,6	74,4	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	16,6	83,4	98	15,6	84,4	82
	Trab. cuenta propia Autónomo/a o Empresario/a	13,0	87,0	81	34,1	65,9	42
	Ayuda familiar	12,9	87,1	46	23,3	76,7	37
	Parado/a ha trabajado antes	12,8	87,2	82	26,5	73,5	55
	Parado/a busca primer empleo	7,2	92,8	32	-	-	21
	Estudiante	-	-	10	-	-	11
	Jubilado/a	34,7	65,3	68	50,3	49,7	66
	Labores del hogar	-	-	1	29,3	70,7	173
	Total	17,1	82,9	466	28,3	71,7	527
Tipo de vivienda	Normalizada	18,2	81,8	426	26,2	73,8	486
	Infravivienda/chabola	5,0	95,0	39	60,8	39,2	37
	Total	17,1	82,9	465	28,3	71,7	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	18,0	82,0	422	28,2	71,8	476
	No	7,6	92,4	43	29,0	71,0	47
	Total	17,1	82,9	465	28,3	71,7	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	19,1	80,9	327	27,5	72,5	377
	Integrado y malas condiciones	15,2	84,8	54	35,4	64,6	58
	Alejado y buenas condiciones	10,9	89,1	52	23,4	76,6	49
	Alejado y malas condiciones	10,1	89,9	32	31,4	68,6	39
	Total	17,1	82,9	465	28,3	71,7	523

Tabla 2.6b. Limitación actividad principal. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y ¿ha tenido que reducir o limitar su actividad principal por alguno o varios dolores o síntomas) (1=no ; 0= sí)								
		Hombres				Mujeres				
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%		
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	
Edad		,001	,974	,958	,990	,000	,970	,956	,984	
	No sabe leer y escribir		,894				,233			
Educación	Leer y escribir /primarios incompletos		,936	,961	,368	2,513	,791	1,081	,607	1,925
	Primarios completos		,718	,819	,276	2,427	,143	1,832	,815	4,117
	Secundarios o superiores		,608	,744	,241	2,301	,171	1,851	,767	4,466
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola		,101	3,608	,779	16,714	,000	,228	,103	,505

2.3 Resumen de resultados

La prevalencia de varios problemas de salud y enfermedades crónicas es mayor en la población gitana, en especial entre las personas de más de 35 años. Ello implica que con mayor frecuencia se vea obligada a limitar o reducir su actividad principal por este motivo.

Las mujeres gitanas se ven con mayor frecuencia obligadas a limitar su actividad principal por problemas de salud que los hombres gitanos en todos los grupos de edad.

El deterioro con la edad del estado de salud en la población gitana es más rápido y grave que en la población general de España, sobre todo en las mujeres.

Para las mujeres gitanas vivir en una vivienda con malas condiciones tiene mayor impacto en términos de limitación de la actividad principal que en la población masculina.

- La mayoría de los problemas de salud y enfermedades crónicas incrementan su prevalencia conforme aumenta la edad por lo que la comparación entre la población gitana y la población general debe realizarse teniendo en cuenta los grupos de edad.
- Para múltiples problemas de salud estudiados (colesterol, depresión, úlcera de estómago, jaquecas o migrañas, etc...) la prevalencia es mayor en la población gitana, hombres y mujeres, mayores de 35 años. En algunos casos también en edades más jóvenes.
- Ejemplos:
 - En la población gitana un 13,6% de los hombres señala tener el colesterol elevado frente al 9,6% en la población general.
 - Las jaquecas son más frecuentes en los hombres y mujeres gitanos (20,7% y 37,1%, respectivamente) que en la población general (3,9% y 9%, respectivamente).
 - Un 16,4% de las mujeres gitanas informa sobre problemas de alergia frente al 10,9% en la población general.
 - La depresión en mujeres gitanas alcanza al 17,6%, frente al 7,7% en la población general.
 - El asma en niños gitanos se encuentra en un 13,3%, frente al 5,4% en la población general.

2.4 Prioridades de intervención.

Los resultados confirman las conclusiones apuntadas en el capítulo anterior al valorar el estado de salud percibido. Permite identificar como objetivos prioritarios:

- Invertir en la salud de la infancia gitana para producir cambios que se mantengan en el tiempo y prevenir la acumulación de los efectos negativos de una mala salud en el ciclo de vida.
- Atender la salud de las mujeres.
- Dirigir la actuación a reducir el rápido envejecimiento de hombres y mujeres.
- Orientar la acción hacia los determinantes socioeconómicos de la salud de la población gitana, con perspectiva de género, desde la infancia. El acceso a la educación y la mejora de la calidad de la vivienda son dos áreas estratégicas.

2.5 Prioridades de investigación.

Se repiten los descritos en el capítulo sobre estado de salud percibido. Realización de estudios longitudinales en la población gitana que permitan establecer a lo largo del ciclo de vida la relación entre percepción de salud, morbilidad, estilos de vida, condiciones socioeconómicas multinivel (individual, hogar, espacio social) y mortalidad. La integración de la perspectiva longitudinal cuantitativa y cualitativa en este tipo de investigación sería valiosa para valorar las pautas culturales de respuesta a las preguntas habituales en las encuestas de salud.