

III.UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

11 Consulta de medicina

Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades
- Intervención
- Investigación

Índice de tablas

Tabla 11.1a. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.1b. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.2a. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

Tabla 11.2b. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Tabla 11.2c. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Tabla 11.2d. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.

Tabla 11.3a Tiempo desde la última consulta de medicina. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres

Tabla 11.3b Tiempo desde la última consulta de medicina. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres

Tabla 11.3c. Visita medicina general. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 11.4a. Lugar de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.4b. Lugar de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.5a. Motivo principal de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.5b. Motivo principal de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.6a. Tipo de cobertura de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.6b. Tipo de cobertura de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.7a. Tiempo desde la última consulta de medicina general. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.7b. Tiempo desde la última consulta de medicina general. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.8a. Ha necesitado asistencia médica y no la ha obtenido. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 11.8b. Ha necesitado asistencia médica y no la ha obtenido. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

11.1 Introducción

La puerta de entrada del sistema sanitario son los centros de atención primaria mediante las consultas de medicina y enfermería. Un adecuado acceso a este primer nivel de atención es el requisito necesario para una mejor atención, la prevención y la derivación eficiente a otros servicios (atención especializada y hospitalaria).

En este primer capítulo sobre la utilización de los servicios de salud se centra la atención en la batería de preguntas incluidas en el cuestionario de Salud a Comunidad Gitana de 2006 que son comparables con la Encuesta Nacional de Salud de 2003 relativas al tiempo transcurrido desde la última consulta de medicina general, los motivos de la consulta, el lugar en el que se realizó, el tiempo empleado para acudir al lugar de la consulta y el tipo de cobertura de la atención recibida. Esta información será útil para conocer en qué medida la entrada al sistema de salud es universal, como se espera de un sistema que es público, gratuito y cuyos servicios son un derecho garantizado para toda la población residente.

El acceso efectivo a los servicios de atención primaria depende de factores tales como la eliminación de los costes económicos, burocráticos, la supresión de barreras relacionadas con la distancia y/o desplazamiento y de la existencia de una adecuada planificación, gestión y dotación de recursos.

En los países en los que el sistema sanitario es universal se tiende a observar una mayor utilización de los servicios por parte de aquella población que cuenta con un peor estado de salud. La atención primaria es por tanto un importante mecanismo para la reducción de las desigualdades sociales en salud, si bien no el único ni probablemente el principal, ya que para reducir la presencia de enfermedades tienen mayor relevancia las políticas públicas en múltiples áreas (educación, urbanismo, inserción laboral, servicios sociales, etc.).

Los datos incluidos a continuación serán útiles para conocer en qué medida está garantizado el acceso a las consultas de medicina general. En este sentido proporciona una imagen focalizada o parcial del conjunto de servicios y posibilidades que presta o podría prestar la atención primaria. Así por ejemplo, no informa sobre las consultas de enfermería, sobre la integración entre atención sanitaria y servicios sociales o sobre el trabajo comunitario. Tampoco se cuenta con información relativa a la atención recibida, la satisfacción con el servicio, los problemas prácticos de acceso (por ejemplo, al solicitar cita o tramitar recetas, listas de espera) o, en general, indicadores que permitan valorar la calidad del servicio.

11.2 Resultados detallados

En términos generales el tiempo transcurrido desde la última visita a una consulta médica es similar en la en la población gitana y en la población general de España, tanto en mujeres como en hombres adultos. Existe un gradiente por clase social en el tiempo desde la última consulta, de tal manera que es más probable haber acudido recientemente a la consulta cuando peores son las condiciones socioeconómicas.

Tabla 11.1a. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad suya?						Total	
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico			
		%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
Hombres	Clase I	19,0	9,2	42,0	27,4	2,4	100	689	
	Clase II	22,1	9,0	43,1	25,1	,6	100	962	
	Clase III	22,6	11,2	41,9	24,0	,4	100	2612	
	Clase IVa	27,5	9,0	42,1	21,1	,2	100	3113	
	Clase IVb	21,6	13,2	41,5	22,5	1,1	100	1190	
	Clase V	25,0	11,1	41,2	21,4	1,4	100	1172	
	Otros	14,9	17,9	45,2	22,1	0	100	101	
	No consta	17,2	35,1	28,1	19,5	0	100	36	
	Población General	23,9	10,5	42,0	22,9	0,7	100	9875	
	Población gitana (IC95%)	26,3 (22,4-30,5)	12,9 (10,0-16,1)	40,0 (35,5-44,5)	19,7 (16,2-23,5)	1,2 (0,4-2,4)	100	465	
Mujeres	Clase I	26,2	10,7	50,3	12,8	0	100	847	
	Clase II	26,7	15,4	45,6	12,3	0	100	1013	
	Clase III	32,2	12,2	43,9	11,5	0,1	100	3137	
	Clase IVa	35,6	13,3	40,4	10,6	0,0	100	3280	
	Clase IVb	34,1	13,5	41,4	11,0	0,0	100	1650	
	Clase V	39,6	13,5	33,8	12,9	0,3	100	1638	
	Otros	37,1	10,5	30,9	21,3	0,1	100	103	
	No consta	27,0	18,7	38,1	16,2	0,0	100	107	
	Población General	33,4	13,1	41,8	11,7	0,1	100	11775	
	Población gitana (IC95%)	33,5 (29,6-37,7)	18,6 (15,5-22,2)	35,1 (31,0-39,2)	12,5 (10,0-15,7)	,3 (0,0-1,2)	100	527	

Entre la población infantil y adolescente, tanto en niñas como en niños, también es similar la pauta de consultas médicas entre población gitana y la población general. En este caso los datos agregados no muestran una pauta clara por clase social ocupacional de la persona de referencia en el hogar en la población general.

Tabla 11.1b. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad del niño/a?					Total	
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico		
		%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	23,7	8,8	55,9	10,8	,8	100	303
	Clase II	24,6	13,6	50,1	11,7	,0	100	377
	Clase III	27,4	10,2	52,2	10,0	,3	100	757
	Clase IVa	27,3	13,8	47,6	11,3	,0	100	1002
	Clase IVb	29,1	13,4	49,2	8,4	,0	100	448
	Clase V	22,8	12,5	49,3	14,7	,7	100	382
	Otros	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	10
	Población General	26,3	12,3	50,1	11,0	,2	100	3307
	Población gitana (IC95%)	29,3 (23,8-34,9)	19,2 (14,7-24,3)	38,6 (32,9-44,7)	12,5 (9,0-17,1)	,4 (0,0-1,8)	100	265
Niñas	Clase I	32,1	11,1	45,2	11,5	,2	100	290
	Clase II	24,7	8,5	58,6	8,1	,1	100	366
	Clase III	28,9	13,3	48,2	9,3	,3	100	726
	Clase IVa	26,9	10,4	51,9	10,6	,1	100	950
	Clase IVb	23,7	13,8	48,0	14,3	,2	100	427
	Clase V	27,0	11,6	43,9	15,5	1,9	100	354
	Otros	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	14
	Población General	27,5	11,6	49,4	11,1	,4	100	3156
	Población gitana (IC95%)	26,9 (21,4-32,7)	22,3 (17,2-27,8)	39,0 (32,8-45,2)	10,4 (7,0-14,9)	1,5 (0,4-4,0)	100	239

Cuando se analiza la pauta de consultas de medicina por grupos de edad se observa en la población adulta masculina y femenina una confirmación para todos los grupos de edad de la afirmación de que las pautas de acceso a la consulta de medicina general son similares en ambas poblaciones.

Resumen

- - En las niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de la población gitana se encuentra la misma probabilidad de haber acudido a una consulta de medicina en el último mes que en la población general de España.

Tabla 11.2a. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad suya?							
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico	Total		
		%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
De 16 a 24 años	Clase I	11,2	6,2	53,1	28,2	1,3	100	69	
	Clase II	15,5	13,7	43,7	27,1	,0	100	105	
	Clase III	17,5	7,0	44,2	31,0	,3	100	257	
	Clase IVa	15,4	6,8	51,9	25,6	,3	100	326	
	Clase IVb	11,3	13,9	46,8	27,0	1,0	100	149	
	Clase V	16,3	4,8	46,1	31,5	1,2	100	134	
	Otros	-	-	-	-	-	-	12	
	No consta	-	-	-	-	-	-	8	
	Población General	14,8	8,6	47,6	28,4	,6	100	1060	
Población gitana (IC95%)	20,6 (14,7-27,7)	12,1 (7,5-17,9)	43,9 (36,2-52,0)	22,5 (16,5-29,9)	,9 (0,0-3,1)	100	151		
De 25 a 34 años	Clase I	10,6	7,9	38,0	36,4	7,2	100	110	
	Clase II	19,7	3,4	45,4	30,0	1,5	100	165	
	Clase III	12,8	7,7	45,7	33,3	,4	100	366	
	Clase IVa	17,0	7,9	48,1	26,9	,1	100	485	
	Clase IVb	10,4	11,4	45,7	29,2	3,2	100	220	
	Clase V	15,3	5,4	46,1	31,8	1,3	100	192	
	Otros	-	-	-	-	-	-	16	
	No consta	-	-	-	-	-	-	5	
	Población General	14,7	7,9	45,8	30,1	1,5	100	1559	
Población gitana (IC95%)	24,8 (17,3-34,2)	12,2 (6,7-19,5)	42,7 (33,6-52,8)	20,3 (13,0-28,7)	,0 (0,0-2,5)	100	97		
De 35 a 54 años	Clase I	18,5	7,9	45,5	27,0	1,2	100	340	
	Clase II	16,3	6,7	47,5	28,9	,6	100	445	
	Clase III	16,0	10,0	44,1	29,4	,5	100	930	
	Clase IVa	20,6	8,0	45,4	26,0	,0	100	1151	
	Clase IVb	21,3	9,5	44,0	24,7	,5	100	432	
	Clase V	18,0	10,8	44,9	23,9	2,3	100	407	
	Otros	-	-	-	-	-	-	29	
	No consta	-	-	-	-	-	-	13	
	Población General	18,6	8,9	44,9	26,9	,6	100	3747	
Población gitana (IC95%)	22,4 (16,5-29,7)	10,9 (6,7-16,6)	42,2 (34,9-50,5)	21,9 (15,9-29,0)	2,6 (0,8-6,1)	100	151		
De 55 y más años	Clase I	32,4	14,7	33,4	19,1	,4	100	170	
	Clase II	38,7	15,2	33,1	13,1	,0	100	247	
	Clase III	38,0	16,4	36,1	9,2	,5	100	1059	
	Clase IVa	47,3	11,9	30,4	10,1	,3	100	1151	
	Clase IVb	39,9	19,2	30,6	10,3	,0	100	389	
	Clase V	43,3	18,2	31,4	6,8	,4	100	439	
	Otros	17,0	15,7	67,0	,3	,0	100	44	
	No consta	-	-	-	-	-	-	10	
	Población General	41,6	15,1	32,8	10,2	,3	100	3509	
Población gitana (IC95%)	51,4 (40,1-64,4)	20,8 (12,0-31,9)	20,9 (12,0-31,9)	6,8 (2,1-14,4)	,0 (0,0-3,9)	100	66		

Tabla 11.2b. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad suya?						Total
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico		
		%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
De 16 a 24 años	Clase I	19,2	6,9	53,5	20,5	,0	100	70
	Clase II	25,8	13,0	43,0	18,2	,0	100	90
	Clase III	17,2	9,2	49,2	24,4	,0	100	220
	Clase IVa	23,3	10,6	47,0	19,0	,0	100	330
	Clase IVb	23,6	15,8	47,8	12,9	,0	100	154
	Clase V	30,2	11,4	35,6	21,3	1,5	100	146
	Otros	-	-	-	-	-	-	9
	No consta	-	-	-	-	-	-	13
	Población General	22,7	11,0	46,1	20,0	,2	100	1032
	Población gitana (IC95%)	22,7 (16,3-30,2)	16,3 (10,9-23,1)	41,3 (33,2-49,4)	19,7 (13,9-27,1)	,0 (0,0-1,8)	100	138
De 25 a 34 años	Clase I	18,5	12,1	56,3	13,1	,0	100	148
	Clase II	20,1	15,8	48,8	15,3	,0	100	160
	Clase III	22,4	7,3	58,2	12,0	,1	100	403
	Clase IVa	26,7	13,3	45,8	14,2	,1	100	522
	Clase IVb	27,3	7,0	50,0	15,7	,0	100	248
	Clase V	20,1	8,6	50,7	20,5	,1	100	172
	Otros	-	-	-	-	-	-	13
	No consta	-	-	-	-	-	-	15
	Población General	23,5	10,5	51,1	14,9	,1	100	1681
	Población gitana (IC95%)	27,8 (20,6-35,4)	19,2 (13,0-26,0)	39,5 (31,2-47,5)	12,4 (7,6-18,6)	1,2 (0,3-4,6)	100	140
De 35 a 54 años	Clase I	23,8	9,4	52,0	14,8	,0	100	383
	Clase II	23,6	11,1	51,2	14,1	,1	100	436
	Clase III	28,9	10,8	45,8	14,3	,2	100	922
	Clase IVa	32,4	10,9	45,0	11,7	,0	100	981
	Clase IVb	29,5	10,9	46,3	13,3	,0	100	498
	Clase V	33,5	9,9	38,4	18,2	,0	100	411
	Otros	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	20
	Población General	29,2	10,8	46,0	13,9	,1	100	3679
	Población gitana (IC95%)	37,5 (30,4-45,2)	18,6 (13,4-25,3)	33,2 (26,-40,8)	10,7 (6,8-16,4)	,0 (0,0-1,6)	100	168
De 55 y más años	Clase I	41,6	13,8	39,9	4,7	,0	100	246
	Clase II	36,5	23,3	35,8	4,5	,0	100	327
	Clase III	44,6	16,7	33,8	4,9	,0	100	1592
	Clase IVa	49,7	16,7	29,7	3,8	,0	100	1447
	Clase IVb	47,0	18,5	29,1	5,3	,1	100	750
	Clase V	54,3	18,4	23,5	3,6	,1	100	909
	Otros	49,3	11,3	29,2	10,3	,0	100	53
	No consta	47,2	21,9	30,3	,5	,0	100	59
	Población General	47,2	17,5	30,8	4,4	,0	100	5383
	Población gitana (IC95%)	52,4 (41,3-62,1)	21,2 (13,2-30,1)	21,5 (14,1-31,4)	4,9 (1,5-10,6)	,0 (0,0-2,9)	100	81

En los menores de 15 años, los datos sobre tiempo desde la última consulta de medicina por grupos de edad muestran también la misma frecuencia de visitas en el último mes en la población gitana que en la población general.

Tabla 11.2c. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad del niño/a?						
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico	Total	
		%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
De 0 a 4 años	Clase I	29,4	9,3	60,8	,0	,5	100	79
	Clase II	40,7	18,8	40,3	,0	,2	100	105
	Clase III	48,1	8,9	40,2	2,6	,1	100	170
	Clase IVa	46,9	14,1	38,6	,3	,0	100	267
	Clase IVb	48,8	12,3	37,3	1,7	,0	100	125
	Clase V	37,8	20,3	39,4	2,4	,2	100	105
	Otros	-	-	-	-	-	-	10
	No consta	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	43,9	13,7	41,1	1,1	,1	100	866
	Población gitana (IC95%)	42,2 (31,3-52,8)	29,2 (19,9-39,8)	25,0 (16,7-35,7)	2,4 (0,5-7,9)	1,2 (0,1-5,8)	100	80
De 5 a 9 años	Clase I	21,1	9,8	57,9	11,2	,0	100	94
	Clase II	16,5	15,5	61,3	6,7	,0	100	106
	Clase III	19,2	11,7	56,2	12,9	,0	100	215
	Clase IVa	21,6	15,0	52,7	10,7	,0	100	259
	Clase IVb	29,9	11,5	50,8	7,8	,0	100	128
	Clase V	18,5	16,3	48,1	15,2	1,9	100	92
	Otros	-	-	-	-	-	-	2
	No consta	-	-	-	-	-	-	2
	Población General	21,3	13,7	54,1	10,7	,2	100	898
	Población gitana (IC95%)	30,6 (20,2-40,8)	16,6 (9,1-25,9)	35,7 (24,9-46,5)	17,2 (10,2-27,4)	,0 (0,0-3,4)	100	77
De 10 a 15 años	Clase I	22,1	7,9	51,2	17,3	1,5	100	130
	Clase II	20,4	8,9	48,0	22,8	,0	100	166
	Clase III	22,5	9,8	55,4	11,6	,7	100	372
	Clase IVa	18,7	12,8	49,8	18,7	,0	100	476
	Clase IVb	13,1	15,7	57,1	14,1	,0	100	195
	Clase V	17,8	6,9	54,7	20,3	,3	100	185
	Otros	-	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	-	3
	Población General	19,3	10,6	52,8	17,0	,3	100	1543
	Población gitana (IC95%)	19,1 (12,8-27,7)	13,7 (8,3-21,4)	50,6 (41,5-60,3)	16,6 (10,5-24,6)	,0 (0,0-2,3)	100	108

Tabla 11.2d. Tiempo desde la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad del niño/a?						Total
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico		
		%	%	%	%	%	%	
De 0 a 4 años	Clase I	44,4	16,3	38,3	,3	,7	100	82
	Clase II	28,6	13,9	56,5	,5	,4	100	105
	Clase III	45,3	17,4	36,0	,3	1,0	100	198
	Clase IVa	41,5	14,0	42,4	1,7	,3	100	234
	Clase IVb	33,7	20,8	41,8	3,8	,0	100	103
	Clase V	45,3	13,4	39,2	,4	1,8	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	-	6
	Población General	40,9	15,9	41,3	1,2	,7	100	828
	Población gitana (IC95%)	27,6 (17,8-38,4)	24,6 (15,4-35,3)	42,8 (31,7-54,6)	2,2 (0,6-8,9)	2,8 (0,6-8,9)	100	67
De 5 a 9 años	Clase I	33,5	8,4	42,9	15,2	,0	100	96
	Clase II	14,9	5,7	69,7	9,7	,0	100	97
	Clase III	26,2	12,3	50,5	11,0	,0	100	203
	Clase IVa	25,8	9,7	57,6	6,9	,0	100	264
	Clase IVb	18,9	18,2	48,4	14,4	,0	100	123
	Clase V	17,8	12,0	51,7	16,2	2,4	100	86
	Otros	-	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	24,4	11,0	53,2	11,2	,2	100	881
	Población gitana (IC95%)	34,4 (24,7-45,6)	24,5 (15,8-34,7)	29,8 (20,2-40,3)	11,4 (5,8-20,0)	,0 (0,0-3,2)	100	78
De 10 a 15 años	Clase I	19,9	9,8	53,6	16,6	,0	100	112
	Clase II	28,3	6,6	52,6	12,4	,0	100	164
	Clase III	20,2	11,5	54,3	13,9	,1	100	325
	Clase IVa	19,4	8,9	53,5	18,1	,0	100	452
	Clase IVb	21,6	7,3	51,0	19,7	,4	100	201
	Clase V	22,0	10,4	42,3	23,5	1,8	100	175
	Otros	-	-	-	-	-	-	15
	No consta	-	-	-	-	-	-	3
	Población General	21,2	9,4	51,7	17,4	,3	100	1447
	Población gitana (IC95%)	19,9 (12,6-28,9)	18,5 (11,7-27,6)	43,9 (34,0-54,3)	16,0 (9,9-25,1)	1,7 (0,4-6,9)	100	94

En la población gitana adulta las consultas de medicina general aumentan su frecuencia con la edad en ambos sexos. El nivel educativo o el tipo de vivienda no apuntan ninguna influencia sobre la frecuencia de las visitas (tabla 11.3c).

Resumen

- Las mujeres gitanas acuden con mayor frecuencia a la consulta de medicina que los hombres.

Tabla 11.3a Tiempo desde la última consulta de medicina. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad suya?						
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico	Total	
		%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	20,6	12,1	43,9	22,5	,9	100	151
	De 25 a 34 años	24,8	12,2	42,7	20,3	,0	100	97
	De 35 a 54 años	22,4	10,9	42,2	21,9	2,6	100	151
	De 55 y más años	51,4	20,8	20,9	6,8	,0	100	66
	Total	26,3	12,9	40,0	19,7	1,2	100	465
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	32,6	16,9	31,6	18,9	,0	100	40
	Leer y escribir /primarios incompletos	26,8	11,9	39,6	21,1	,7	100	241
	Primarios completos	22,5	15,3	39,6	19,3	3,4	100	86
	Secundarios o superiores	28,3	11,9	43,1	16,7	,0	100	82
	Total	26,8	13,0	39,6	19,7	1,0	100	449
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	31,0	7,3	36,8	24,9	,0	100	48
	Trab. cuenta ajena Temporal	24,5	13,9	36,9	21,6	3,1	100	98
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	12,3	16,3	42,0	29,4	,0	100	80
	Ayuda familiar	16,4	11,9	54,2	17,5	,0	100	46
	Parado ha trabajado antes	31,9	6,0	45,0	16,5	,6	100	82
	Parado busca primer empleo	21,5	8,6	52,6	17,3	,0	100	32
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	10
	Jubilado	48,0	23,2	21,0	5,3	2,5	100	68
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	-	1
	Total	26,3	12,9	40,0	19,7	1,2	100	465
Tipo de vivienda	Normalizada	27,2	12,4	39,7	19,5	1,1	100	425
	Infravivienda/chabola	15,6	17,6	43,1	22,3	1,4	100	39
	Total	26,3	12,8	40,0	19,7	1,2	100	464
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Si	26,1	13,0	41,1	19,0	,9	100	421
	No	28,5	11,3	28,2	28,0	4,0	100	43
	Total	26,3	12,8	40,0	19,7	1,2	100	464
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	26,0	13,0	41,3	19,4	,2	100	326
	Integrado y malas condiciones	28,4	9,2	40,1	17,7	4,5	100	54
	Alejado y buenas condiciones	23,9	16,4	40,8	18,8	,0	100	52
	Alejado y malas condiciones	28,9	11,6	25,7	27,5	6,4	100	32
	Total	26,3	12,8	40,0	19,7	1,2	100	464

Tabla 11.3b Tiempo desde la última consulta de medicina. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico (personalmente o por teléfono) por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad suya?						Total	N (No Ponderado)
		En las últimas dos semanas	Hace más de dos semanas y menos de un mes	Hace un mes o más y menos de un año	Hace un año o más de un año	Nunca ha ido al médico			
		%	%	%	%	%	%		
Grupos de edad	De 16 a 24 años	22,7	16,3	41,3	19,7	,0	100	138	
	De 25 a 34 años	27,8	19,2	39,5	12,4	1,2	100	140	
	De 35 a 54 años	37,5	18,6	33,2	10,7	,0	100	168	
	De 55 y más años	52,4	21,2	21,5	4,9	,0	100	81	
	Total	33,5	18,6	35,1	12,5	,3	100	527	
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	39,4	19,9	34,4	6,3	,0	100	84	
	Leer y escribir /primarios incompletos	38,4	18,0	30,7	12,9	,0	100	282	
	Primarios completos	23,7	21,9	39,4	15,0	,0	100	73	
	Secundarios o superiores	21,9	17,2	41,3	17,5	2,1	100	70	
	Total	33,9	18,8	34,2	12,8	,3	100	509	
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fija	39,6	17,0	29,4	14,0	,0	100	40	
	Trab. cuenta ajena Temporal	26,8	13,9	47,8	9,7	1,7	100	82	
	Trab. cuenta propia Autónoma o Empresaria	37,8	22,7	22,6	16,8	,0	100	42	
	Ayuda familiar	26,1	24,9	28,7	20,4	,0	100	37	
	Parada ha trabajado antes	27,3	23,3	31,6	17,9	,0	100	55	
	Parada busca primer empleo	-	-	-	-	-	-	21	
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	11	
	Jubilada	50,4	18,9	27,6	3,1	,0	100	66	
	Labores del hogar	32,9	18,5	35,5	13,1	,0	100	173	
	Total	33,5	18,6	35,1	12,5	,3	100	527	
Tipo de vivienda	Normalizada	33,4	18,5	34,9	12,8	,3	100	486	
	Infravivienda/chabola	35,4	22,8	33,7	8,1	,0	100	37	
	Total	33,5	18,8	34,8	12,6	,3	100	523	
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Si	34,2	18,6	33,9	13,0	,3	100	476	
	No	24,8	21,1	46,7	7,4	,0	100	47	
	Total	33,5	18,8	34,8	12,6	,3	100	523	
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	34,7	18,3	33,4	13,2	,4	100	377	
	Integrado y malas condiciones	29,3	26,7	35,6	8,4	,0	100	58	
	Alejado y buenas condiciones	33,6	16,3	36,5	13,6	,0	100	49	
	Alejado y malas condiciones	28,4	15,1	45,7	10,9	,0	100	39	
	Total	33,5	18,8	34,8	12,6	,3	100	523	

Tabla 11.3c. Visita medicina general. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y ¿cuánto tiempo hace que consultó a un médico –personalmente o por teléfono- por última vez por algún problema, molestia o enfermedad suya? (1=hace menos de dos semanas; 0= hace más de dos semanas –incluye nunca-)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic odds ratio 95%				Ic odds ratio 95%	
		SIG.	ODDS RATIO AJUSTADA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	SIG.	ODDS RATIO AJUSTADA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Edad		,000	1,032	1,017	1,047	,000	1,026	1,012	1,040
Educación	No sabe leer y escribir	,411				,113			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,828	,915	,411	2,039	,236	1,412	,798	2,499
	Primarios completos	,665	,814	,320	2,068	,557	,795	,371	1,707
	Secundarios o superiores	,468	1,417	,552	3,635	,695	,850	,378	1,912
Tipo de vivienda	Infra vivienda/chabola	,192	,524	,198	1,383	,920	,960	,435	2,121

El principal lugar donde se realizaron las consultas de medicina fue en centros de salud (más de 6 de cada 10 visitas se realiza en los mismos) tanto en la población gitana como en la población general, en todas las edades. Los centros de especialidades siguen en importancia a los centros de salud. Por su parte, los servicios de urgencia hospitalarios o en centros de atención primaria tienen un papel menor para todos los grupos de población comparados, destacando únicamente la mayor presencia relativa de niñas gitanas en las urgencias hospitalarias. Las consultas realizadas por profesionales médicos de sociedades médicas son también poco frecuentes para ambas poblaciones, pero hay una diferencia marcada entre población gitana, que apenas accede a este tipo de consultas, y la población general.

Tabla 11.4a. Lugar de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Dónde tuvo lugar la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas?									Total
		Centro de salud/consultorio	Ambulatorio/centro de especialidades	Consulta externa de un hospital	Servicios de urgencias de un ambulatorio	Servicios de urgencias de un hospital	Consulta de médico particular	Consulta de médico de una sociedad	Otro lugar		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hombres	Clase I	38,0	11,2	12,5	,8	1,7	7,5	21,9	6,2	100	135
	Clase II	44,5	13,7	13,5	,4	2,6	6,9	12,6	5,8	100	211
	Clase III	54,5	14,6	9,4	1,9	3,3	3,4	7,6	5,2	100	683
	Clase IVa	61,9	15,0	8,5	1,6	2,5	2,2	2,7	5,6	100	875
	Clase IVb	69,1	17,1	6,3	1,3	,8	2,3	1,1	2,0	100	296
	Clase V	70,5	13,2	6,1	1,3	2,3	,8	,7	5,1	100	322
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Población General	58,7	14,5	8,9	1,4	2,4	3,2	5,6	5,2	100	2550
Población gitana (IC95%)	63,8 (54,8-71,8)	15,7 (10,0-23,0)	10,0 (5,5-16,2)	2,0 (0,3-5,2)	3,5 (1,1-7,7)	3,4 (1,1-7,7)	1,2 (0,0-3,8)	,4 (0,0-2,1)	100	119	
Mujeres	Clase I	31,3	13,1	6,3	,6	4,0	11,3	24,9	8,5	100	229
	Clase II	50,4	15,0	10,2	2,6	1,3	5,8	9,7	5,1	100	293
	Clase III	55,6	16,2	6,7	1,2	1,7	4,6	9,1	5,0	100	1116
	Clase IVa	64,4	18,2	6,6	1,3	1,8	2,7	2,1	2,9	100	1235
	Clase IVb	70,7	14,7	5,4	3,6	1,1	1,5	1,3	1,8	100	624
	Clase V	67,9	14,9	5,7	1,2	3,0	2,0	1,2	4,2	100	677
	Otros	25,7	5,8	12,1	,0	2,2	11,9	33,1	9,2	100	41
	No consta	63,0	19,5	5,3	5,0	,0	,0	2,1	5,2	100	34
	Población General	60,0	16,0	6,6	1,6	2,0	3,7	5,9	4,1	100	4249
Población gitana (IC95%)	61,3 (54,0-68,4)	12,5 (8,2-18,0)	12,6 (8,2-18,0)	1,4 (0,2-3,6)	1,7 (0,4-4,5)	9,9 (5,9-14,7)	,0 (0,0-1,5)	,6 (0,0-2,7)	100	172	

Tabla 11.4b. Lugar de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		¿Dónde tuvo lugar la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas?									
		Centro de salud/consultorio	Ambulatorio/centro de especialidades	Consulta externa de un hospital	Servicios de urgencias de un ambulatorio	Servicios de urgencias de un hospital	Consulta de médico particular	Consulta de médico de una sociedad	Otro lugar	Total	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	23,7	10,0	8,6	2,4	4,5	13,0	31,0	6,7	100	74
	Clase II	59,2	10,0	3,8	,0	7,1	6,8	10,0	3,1	100	99
	Clase III	57,1	10,6	8,6	,1	3,0	9,7	10,1	,8	100	191
	Clase IVa	60,1	15,7	8,3	2,6	1,4	5,9	4,0	2,0	100	284
	Clase IVb	62,3	16,3	6,3	1,9	3,2	4,6	5,3	,1	100	123
	Clase V	75,0	13,4	1,9	2,0	3,1	1,1	2,0	1,4	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Población General	57,8	13,1	6,8	1,6	3,1	6,7	8,7	2,2	100	875
Población gitana (IC95%)	64,4 (53,3-74,6)	27,8 (18,5-38,4)	1,4 (0,1-6,0)	3,2 (0,5-8,2)	,0 (0,0-3,3)	2,0 (0,5-8,2)	1,2 (0,1-6,0)	,0 (0,0-3,3)	100	74	
Niñas	Clase I	33,9	7,1	4,5	,0	6,0	11,7	27,1	9,7	100	79
	Clase II	38,3	17,3	14,4	,0	6,4	11,9	7,6	4,2	100	81
	Clase III	63,2	12,9	2,5	1,8	1,9	9,7	8,1	,0	100	195
	Clase IVa	62,3	19,6	2,2	2,0	7,3	3,4	2,2	1,1	100	271
	Clase IVb	59,4	24,2	5,1	5,7	,5	,0	3,8	1,3	100	101
	Clase V	68,3	13,1	6,5	5,7	4,4	1,1	,0	1,0	100	98
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Población General	56,5	15,6	4,7	2,3	4,8	6,3	7,4	2,2	100	840
Población gitana (IC95%)	74,7 (62,9-84,1)	12,4 (6,1-22,6)	2,4 (0,6-9,8)	,0 (0,0-3,9)	8,1 (3,0-16,6)	2,4 (0,6-9,8)	,0 (0,0-3,9)	,0 (0,0-3,9)	100	62	

Los motivos por los que se acude a una consulta de medicina general varían en la población gitana y en la población general. Aunque para todos los grupos se observa que el principal motivo para acudir a la consulta es la búsqueda de diagnóstico y/o tratamiento, en algunos grupos de motivos se encuentran diferencias. En general en la población gitana tiene un mayor peso el diagnóstico y/o tratamiento y pierden relevancia las revisiones (a excepción de las mujeres gitanas en edad adulta) y también las relacionadas con la gestión de recetas.

En el caso de las revisiones es donde se observa un gradiente social más marcado. El porcentaje más bajo se encuentra en población gitana y asciende conforme se asciende en la jerarquía de clase social ocupacional (de la clase V a la clase I), hasta el punto de que en las mujeres de clase social I llega a ser el principal motivo de consulta médica.

Resumen

- Las revisiones de la salud en las consultas de medicina de la población gitana son menos frecuentes.

Tabla 11.5a. Motivo principal de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuál fue el motivo principal de esta última consulta al médico?						N (no ponderado)
		Diagnóstico y/o tratamiento	Revisión	Sólo dispensación de recetas	Parte de baja, confirmación, o alta	Otros motivos	Total	
		%	%	%	%	%	%	
Hombres	Clase I	44,8	35,0	14,7	1,9	3,6	100	135
	Clase II	47,0	29,6	13,9	6,2	3,3	100	211
	Clase III	39,2	26,0	24,2	6,0	4,6	100	683
	Clase IVa	40,9	26,5	25,0	3,1	4,5	100	875
	Clase IVb	41,7	20,3	31,2	5,3	1,5	100	296
	Clase V	43,4	15,8	33,9	2,9	4,1	100	322
	Otros	-	-	-	-	-	-	19
	No consta	-	-	-	-	-	-	9
	Población General del España	41,8	25,2	24,8	4,2	3,9	100	2550
Población gitana (IC95%)	54,4 (45,6-63,3)	15,9 (10,0-23,0)	15,4 (10,0-23,0)	5,7 (2,6-11,1)	8,6 (4,3-14,2)	100	119	
Mujeres	Clase I	38,9	42,7	14,5	3,0	,8	100	229
	Clase II	50,6	26,2	16,5	2,0	4,7	100	293
	Clase III	38,0	25,6	30,1	2,2	4,0	100	1116
	Clase IVa	43,6	25,0	26,1	1,9	3,5	100	1235
	Clase IVb	44,2	23,8	26,1	2,6	3,2	100	624
	Clase V	38,1	20,9	36,0	,3	4,6	100	677
	Otros	34,3	41,0	24,3	,0	,4	100	41
	No consta	54,3	2,9	34,6	,0	8,1	100	34
	Población General del España	41,7	25,6	27,1	1,9	3,7	100	4249
Población gitana (IC95%)	55,4 (47,7-62,4)	24,6 (18,5-31,2)	13,2 (8,7-18,7)	,6 (0,0-2,7)	6,2 (3,3-10,6)	100	172	

Tabla 11.5b. Motivo principal de la última consulta de medicina. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		¿Cuál fue el motivo principal de esta última consulta al médico?					N (no ponderado)
		Diagnóstico y/o tratamiento	Revisión	Sólo dispensación de recetas	Otros motivos	Total	
		%	%	%	%	%	
Niños	Clase I	76,1	21,9	,0	2,0	100	74
	Clase II	69,6	25,9	2,2	2,3	100	99
	Clase III	61,7	31,0	3,6	3,7	100	191
	Clase IVa	65,9	27,6	1,5	5,0	100	284
	Clase IVb	69,2	23,5	1,0	6,3	100	123
	Clase V	73,2	16,2	,4	10,3	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	4
	Población General	67,6	25,7	1,7	5,0	100	875
Población gitana (IC95%)	80,1 (70,2-88,0)	11,9 (6,0-20,5)	,0 (0,0-3,3)	7,9 (3,3-15,6)	100	74	
Niñas	Clase I	63,9	33,1	,0	3,0	100	79
	Clase II	69,1	21,3	,0	9,6	100	81
	Clase III	74,1	24,4	,1	1,3	100	195
	Clase IVa	75,8	16,5	3,3	4,4	100	271
	Clase IVb	69,5	25,1	,5	4,9	100	101
	Clase V	83,3	13,0	1,6	2,1	100	98
	Otros	-	-	-	-	-	11
	No consta	-	-	-	-	-	4
	Población General	73,5	21,5	1,2	3,8	100	840
Población gitana (IC95%)	82,8 (71,8-90,4)	11,7 (5,1-20,6)	,7 (0,0-3,9)	4,8 (1,3-12,2)	100	62	

La principal forma de cobertura de las consultas de medicina, para todos los grupos es la Seguridad Social. La cobertura a través de sociedades médicas cobran sin embargo una importancia relativa alta en la clase social I. Conforme se empeora la posición en la jerarquía ocupacional

se incrementa la importancia de la Seguridad Social, encontrándose los niveles más altos en las clases IV y V y en la población gitana.

En la población gitana adulta se encuentra una presencia relativa de consultas de tipo privado relevante, sobre todo en mujeres, lo que no ocurre en la población menor de 15 años.

Tabla 11.6a. Tipo de cobertura de la última consulta de medicina. Comparación población EN-SE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		El médico al que acudió en esta última consulta realizada era de:					
		Seguridad social	Sociedad médica	Consulta privada	Iguala médica, médico empresa, etc.	Total	
		%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Hombres	Clase I	61,1	26,7	10,1	2,1	100	135
	Clase II	74,6	12,8	7,8	4,8	100	211
	Clase III	84,7	8,6	3,5	3,1	100	683
	Clase IVa	90,5	3,0	2,7	3,9	100	875
	Clase IVb	95,5	,6	2,5	1,5	100	296
	Clase V	95,4	,1	,8	3,7	100	322
	Otros	-	-	-	-	-	19
	No consta	-	-	-	-	-	9
	Población General	86,7	6,2	3,7	3,4	100	2550
	Población gitana (IC95%)	92,3 (86,0-95,8)	2,7 (0,6-6,4)	4,6 (2,0-9,8)	,4 (0,0-2,1)	100	120
Mujeres	Clase I	55,5	26,9	14,8	2,7	100	229
	Clase II	80,1	11,2	6,5	2,1	100	293
	Clase III	84,0	10,3	4,8	,9	100	1116
	Clase IVa	93,5	2,3	3,1	1,1	100	1235
	Clase IVb	96,6	1,3	1,3	,8	100	624
	Clase V	95,8	1,2	2,6	,4	100	677
	Otros	47,6	41,1	11,3	,0	100	41
	No consta	94,3	4,7	,9	,0	100	34
	Población General	88,1	6,6	4,3	1,1	100	4249
	Población gitana (IC95%)	89,1 (83,3-92,7)	,5 (0,0-2,7)	10,5 (6,4-15,4)	,0 (0,0-1,5)	100	172

Resumen

- - La Seguridad Social atiende la mayor parte de las consultas de medicina en la población gitana.

Tabla 11.6b. Tipo de cobertura de la última consulta de medicina. Comparación población EN-SE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		El médico al que acudió el niño/a en esta última consulta realizada era de:					
		Seguridad social	Sociedad médica	Consulta privada	Iguala médica, médico empresa, etc.	Total	
		%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	50,1	37,9	11,9	,0	100	74
	Clase II	78,8	11,2	9,6	,4	100	99
	Clase III	78,0	10,4	11,5	,0	100	191
	Clase IVa	88,1	4,2	6,8	,9	100	284
	Clase IVb	90,1	5,3	4,6	,0	100	123
	Clase V	96,9	2,0	1,1	,0	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	4
	Población General	82,2	9,9	7,6	,3	100	875
	Población gitana (IC95%)	92,7 (84,6-95,7)	,0 (0,0-3,2)	7,3 (3,3-15,4)	,0 (0,0-3,2)	100	74
Niñas	Clase I	51,6	28,0	18,0	2,4	100	79
	Clase II	75,0	9,3	13,6	2,1	100	81
	Clase III	80,7	9,6	9,6	,0	100	195
	Clase IVa	93,8	1,9	3,8	,5	100	271
	Clase IVb	96,2	3,8	,0	,0	100	101
	Clase V	97,9	,0	1,1	1,0	100	98
	Otros	-	-	-	-	-	11
	No consta	-	-	-	-	-	4
	Población General	83,5	8,3	7,4	,8	100	840
	Población gitana (IC95%)	95,1 (87,8-98,7)	,0 (0,0-3,9)	3,5 (0,6-9,8)	1,4 (0,0-3,9)	100	62

El tiempo empleado para acudir a la consulta fue 3,7 minutos mayor en el caso de las mujeres gitanas adultas que en las mujeres de la población general (IC95% 1,1-7,6 minutos, p=0.009). En el resto de grupos el contraste de medias no arroja resultados significativos.

Tabla 11.7a. Tiempo desde la última consulta de medicina general. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Media, mediana, número de casos, error típico de la media y desviación típica.
Población de 16 y más años. Valores ponderados.

		En esa última consulta médica, ¿cuánto tiempo tardó aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta?				
		Media	Mediana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica
Hombres	Clase I	14,4	10	126	1,61	18,04
	Clase II	16,5	10	211	1,28	18,59
	Clase III	14,8	10	531	,70	16,09
	Clase IVa	14,7	10	865	,54	15,91
	Clase IVb	13,8	10	272	,80	13,20
	Clase V	14,3	10	278	,80	13,30
	Otros	-	-	10	-	-
	No consta	-	-	6	-	-
	Población General	14,8	10	2300	,33	15,73
	Población gitana (IC95%)	17,1 (13,7-20,5)	15	122	1,72	19,01
Mujeres	Clase I	14,3	10	203	,87	12,45
	Clase II	14,7	10	244	,91	14,22
	Clase III	14,2	10	817	,43	12,34
	Clase IVa	14,7	10	1098	,46	15,21
	Clase IVb	14,0	10	466	,59	12,75
	Clase V	15,9	10	533	,66	15,25
	Otros	-	10	27	-	-
	No consta	-	5	21	-	-
	Población General	14,7	10	3410	,24	14,23
	Población gitana (IC95%)	19,0 (15,8-22,3)	10	173	1,62	21,26

Tabla 11.7b. Tiempo desde la última consulta de medicina general. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Media, mediana, número de casos, error típico de la media y desviación típica.
Población de 15 y menos años. Valores ponderados.

		En esa última consulta médica, ¿cuánto tiempo tardó aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta?				
		Media	Mediana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica
Niños	Clase I	12,5	10	73	1,78	15,17
	Clase II	13,0	10	85	1,27	11,73
	Clase III	12,4	10	183	,89	12,04
	Clase IVa	12,5	10	240	,88	13,70
	Clase IVb	13,1	10	128	1,06	12,02
	Clase V	16,0	10	93	1,43	13,71
	Otros	-	-	3	-	-
	No consta	-	-	3	-	-
	Población General	13,0	10	807	,46	12,99
	Población gitana (IC95%)	16,0 (12,0-20,1)	10	76	2,00	17,52
Niñas	Clase I	14,2	10	95	2,11	20,64
	Clase II	12,7	10	85	1,28	11,77
	Clase III	11,2	10	193	,59	8,25
	Clase IVa	12,8	10	236	,85	13,10
	Clase IVb	12,3	10	96	1,66	16,22
	Clase V	11,8	10	96	,97	9,50
	Otros	-	-	5	-	-
	No consta	-	-	10	-	-
	Población General	12,3	10	815	,46	13,09
	Población gitana (IC95%)	13,7 (11,1-16,2)	10	64	1,27	10,17

El porcentaje de casos en los que la población gitana no ha recibido asistencia médica habiéndola necesitado es muy similar al de la población general.

Tabla 11.8a. Ha necesitado asistencia médica y no la ha obtenido. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		En los últimos doce meses ¿alguna vez ha necesitado asistencia médica y no la ha obtenido?			
		Sí	No	Total	
		%	%	%	N (no ponderado)
Hombres	Clase I	5,1	94,9	100	689
	Clase II	5,6	94,4	100	962
	Clase III	3,9	96,1	100	2612
	Clase IVa	5,2	94,8	100	3113
	Clase IVb	5,1	94,9	100	1190
	Clase V	3,9	96,1	100	1172
	Otros	1,0	99,0	100	101
	No consta	,0	100	100	36
	Población General	4,7	95,3	100	9875
	Población gitana (IC95%)	3,5 (2,0-5,4)	96,5 (94,6-98,0)	100	465
Mujeres	Clase I	4,9	95,1	100	847
	Clase II	7,0	93,0	100	1013
	Clase III	6,4	93,6	100	3137
	Clase IVa	7,6	92,4	100	3280
	Clase IVb	6,8	93,2	100	1650
	Clase V	6,4	93,6	100	1638
	Otros	,0	100	100	103
	No consta	4,1	95,9	100	107
	Población General	6,7	93,3	100	11775
	Población gitana (IC95%)	6,1 (4,4-8,6)	93,9 (91,4-95,6)	100	527

Tabla 11.8b. Ha necesitado asistencia médica y no la ha obtenido. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		En los últimos doce meses ¿alguna vez el niño/a ha necesitado asistencia médica y no la ha obtenido?			
		Sí	No	Total	
		%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	5,4	94,6	100	303
	Clase II	1,9	98,1	100	377
	Clase III	5,1	94,9	100	757
	Clase IVa	3,7	96,3	100	1002
	Clase IVb	4,0	96,0	100	448
	Clase V	1,9	98,1	100	382
	Otros	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	10
	Población General	3,8	96,2	100	3307
	Población gitana (IC95%)	2,3 (0,9-4,7)	97,7 (95,3-99,1)	100	265
Niñas	Clase I	1,9	98,1	100	290
	Clase II	5,4	94,6	100	366
	Clase III	4,7	95,3	100	726
	Clase IVa	5,0	95,0	100	950
	Clase IVb	3,3	96,7	100	427
	Clase V	2,2	97,8	100	354
	Otros	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	14
	Población General	4,1	95,9	100	3156
	Población gitana (IC95%)	3,2 (1,5-6,3)	96,8 (93,7-98,5)	100	239

11.3 Resumen de resultados

La población gitana acude a las consultas de medicina en la misma medida que la población de clase trabajadora. Este resultado en la población adulta se puede relacionar con el gradiente por posición socioeconómica en la frecuencia de consultas y con el peor estado de salud de la población gitana.

La frecuencia de las consultas de medicina general es mayor en las mujeres gitanas que en los hombres.

En la población gitana se observan los niveles más bajos de consultas médicas motivadas por revisiones del estado de salud (las de tipo preventivo y seguimiento), mientras que aumentan las relacionadas con el diagnóstico y/o tratamiento. También tienen poca presencia las visitas relacionadas con la gestión de recetas. El porcentaje de casos en los que la población gitana no ha recibido asistencia médica habiéndola necesitado es bajo y muy similar al de la población general.

La mayor parte de las consultas se realizaron en centros de salud o de especialidades, teniendo una baja relevancia los servicios de urgencias hospitalarios o en centros de atención primaria. Estas consultas han sido atendidas de forma casi exclusiva en la población gitana por la Seguridad Social, aunque en algunos casos, se recurre a las consultas de tipo privado (mujeres adultas). El tiempo empleado para acudir a la consulta fue mayor para las mujeres gitanas.

En conclusión se observa que el sistema universal de acceso a los servicios de medicina general favorece un mayor acceso a los servicios de salud de la población con peor salud (lo que incluye a la población gitana), mientras que la orientación en la utilización de los servicios está motivada principalmente por la situación enfermedad frente al uso preventivo, en especial en la población gitana.

- El tiempo transcurrido desde la última visita a una consulta de medicina general ha sido de dos semanas para un 26,2% de los hombres gitanos, frente al 25% en clase social V en la población general y el 19% en la clase social I. En las mujeres estos porcentajes son del 33,5% (población gitana), 39,6% (clase social V) y 26,2% (clase social I).
- Un 26,3% de los hombres gitanos ha acudido a la consulta de medicina general en las dos últimas semanas, frente al 25% en la clase social V en la población general y al 19% en la clase social I. En las mujeres estos porcentajes son del 33,5% (población gitana), 39,6% (clase social V) y 26,2% (clase social I).
- La frecuencia de las consultas de medicina general es mayor en las mujeres gitanas que en los hombres.

11.4 Prioridades de intervención.

- Favorecer una orientación preventiva de los servicios de atención primaria del sistema público de salud, sin olvidar la orientación comunitaria, en especial en aquellos barrios/asentamientos con mayor presencia de población gitana.

11.5 Prioridades de investigación.

Estudiar los elementos relativos al contexto urbano, condiciones de vida, pautas de vida y formas de pensar que explican las pautas de utilización y la calidad de los servicios de salud en atención primaria. Aproximación al objeto de estudio tanto desde el nivel individual (profesionales y población gitana), como organizacional (de los servicios de atención primaria).