

## 13 Hospitalización

### Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades Intervención
- Prioridades Investigación

### Índice de tablas

*Tabla 13.1a. Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.1b. Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.2a. Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.*

*Tabla 13.2b. Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.*

*Tabla 13.3a. Hospitalización. Población Gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio, según sexo.*

*Tabla 13.3b. Hospitalización (sin partos). Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.*

*Tabla 13.4a. Días de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.4b. Días de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Niños y niñas.*

*Tabla 13.5a. Motivo de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.5b. Motivo de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.6. Lista de espera. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.7a. Cobertura de la hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 13.7b. Cobertura de la hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.*

### 13.1 Introducción

El volumen de utilización de la atención hospitalaria depende fundamentalmente del nivel de salud de la población y la forma en que se define el derecho a la atención sanitaria en cada país. En el caso español, la asistencia es universal (garantizada para toda la población residente en España) y gratuita por lo que no existen costes económicos de acceso. De acuerdo con esto cabe esperar que el nivel de utilización de hospitales por parte de la población gitana se corresponda con el estado de salud de este grupo de población.

No obstante, incluso en condiciones de universalidad y gratuidad, existen importantes elementos que intervienen en el proceso de transformación de un problema de salud en una hospitalización. Entre ellos se puede destacar el tiempo que transcurre hasta que la persona es consciente de que padece un problema y debe buscar atención profesional, es decir, depende del mayor o menor retraso en el autodiagnóstico y la motivación para ser atendido.

En este sentido se puede recordar la explicación de Teresa San Román con respecto a la tendencia a retrasar el tratamiento en la población gitana: "no basta con tener el camino abierto para poder ir al médico, hay que pensar que el médico es pertinente para solucionar nuestro

problema”<sup>41</sup>. De acuerdo con esto la percepción que en la población gitana se tenga de la eficiencia de las intervenciones incidirá en la motivación para acudir al sistema hospitalario. Dichas percepciones interaccionan con un concepto de salud en el que se define la enfermedad como una situación invalidante ligada o cercana a la muerte lo que explicaría la tendencia a retrasar la atención<sup>42</sup>. Por otro lado, volviendo a Teresa San Román, dichas percepciones se producen en condiciones de vida que hacen valorar las situaciones de forma propia y diferenciada de la población mayoritaria y lleva a enfrentarse a los problemas de salud a partir de actitudes culturales aprendidas que suelen ser funcionales para las condiciones de vida<sup>43</sup>.

Otro factor, sería la posible existencia de barreras de entrada distintas a los costes económicos, como las listas de espera. En el sistema sanitario español las listas de espera son más frecuentes cuando se trata de atender problemas de salud progresivos o de curso lento (como el caso de las cataratas) o cuando se trata de intervenciones que demandan recursos que son difíciles de obtener o de alto coste (el ejemplo más claro serían los trasplantes). Por el contrario, cuando se trata de episodios graves, de curso corto o que implican urgencia vital son atendidos rápidamente a partir de los servicios de urgencias (se puede pensar por ejemplo en accidentes de coche grave, apendicitis o similares).

La doble vía de entrada al sistema hospitalario, esto es, a través de urgencias o mediante la derivación desde otros niveles de atención (sobre todo desde los centros de salud y la atención especializada) se relaciona en la literatura sobre desigualdades sociales en salud con dos procesos diferenciados. Por un lado, es más frecuente que las poblaciones que reúnen peores condiciones sociales tiendan al retraso en el autodiagnóstico, a la búsqueda más tardía de atención y a optar de forma preferente por los servicios de urgencias, a la vez que son el grupo con mayores necesidades de atención secundaria y terciaria debido a su peor estado de salud. Por otro lado, la población que cuenta con mejores condiciones socioeconómicas realiza un mayor número de visitas de tipo preventivo, y por ello, sus entradas al sistema hospitalario, en términos relativos tienden a producirse a partir de la derivación previa y a realizarse de forma programada. Por estos motivos, los resultados de este capítulo referido a la atención hospitalaria, deben valorarse a la luz de lo comentado en los capítulos sobre atención sanitaria de urgencias, el seguimiento de prácticas preventivas y sobre el estado de salud general de la población.

Existen pocos precedentes de estudios sobre el nivel de utilización de los servicios hospitalarios en la población gitana. Se puede destacar, sin embargo, el trabajo de Sánchez Serrano et al.<sup>44</sup> quienes observaron que en el caso de menores de etnia gitana atendidos en un hospital terciario en Alicante era más frecuente que en la población general que no hubieran recibido atención regular en centros de atención primaria, a la vez que se trataba de menores en los que era más fácil encontrar casos de hospitalización previa.

De forma similar, el trabajo de Díez López et al.<sup>45</sup> (2002) encuentra que en la población lactante existe una sobrerrepresentación de los casos de ingresos hospitalarios en un Hospital universitario de Valladolid en el grupo de población gitana, si se considera su peso global en la población. Igualmente había mayor frecuencia de reingresos y una prevalencia mayor de procesos respiratorios que en otros grupos.

---

<sup>41</sup> San Román, Teresa (1986) *Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos*. Madrid, Alianza: 147.

<sup>42</sup> Ministerio de Sanidad y Consumo (2005) *Salud y Comunidad Gitana*. Madrid: Dirección de Salud Pública y Fundación Secretariado Gitano.

<sup>43</sup> San Roman, Teresa, *op. cit.* p. 147-148.

<sup>44</sup> Sánchez Serrano, F.J. et al. (2002) *Diferencia étnica en la actividad asistencial de urgencias. Aproximación a la realidad gitana*. *Anales Españoles de Pediatría*, 56, 1: 17-22.

<sup>45</sup> Díez López, I. et al. (2002) *Influencia de la etnia gitana en el ingreso hospitalario de lactantes y su patología prevalente*. *Anales Españoles de Pediatría*, 57, 3: 215-219.

### 13.2 Resultados detallados

En términos generales la población gitana femenina, pese a su mayor juventud, presenta un mayor porcentaje de personas que han estado hospitalizadas en el último año. La mayor tasa de hospitalización en las mujeres gitanas se observa tanto cuando se incluyen las hospitalizaciones relacionadas con el embarazo y parto, como cuando no se incluye esta causa. Esta tendencia se observa tanto en la población adulta como en la de 15 y menos años.

El porcentaje de hospitalizaciones muestra un gradiente por clase social ocupacional. En la clase social I las hospitalizaciones son menos frecuentes y el porcentaje aumenta conforme se empeora la posición en la jerarquía ocupacional, llegando al porcentaje más elevado de personas hospitalizadas en la población gitana.

**Tabla 13.1a.** Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

	Hombres				Mujeres							
	Durante los últimos doce meses ¿ha estado hospitalizado como paciente al menos durante una noche?				Durante los últimos doce meses ¿ha estado hospitalizado como paciente al menos durante una noche?				Hospitalizaciones (sin contar partos)			
	Sí	No	Total	Total	Sí	No	Total	Total	Sí	No	Total	Total
	%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (No Ponderado)
Clase I	8,3	91,7	100	689	7,7	92,3	100	847	5,4	94,6	100	847
Clase II	9,0	91,0	100	962	10,5	89,5	100	1013	8,6	91,4	100	1013
Clase III	7,8	92,2	100	2612	10,8	89,2	100	3137	8,7	91,3	100	3137
Clase IVa	9,7	90,3	100	3113	11,1	88,9	100	3280	9,0	91,0	100	3280
Clase IVb	10,8	89,2	100	1190	9,0	91,0	100	1650	7,2	92,8	100	1650
Clase V	10,4	89,6	100	1172	11,9	88,1	100	1638	10,9	89,1	100	1638
Otros	6,2	93,8	100	101	8,4	91,6	100	103	7,8	92,2	100	103
No consta	5,3	94,7	100	36	8,0	92,0	100	107	6,8	93,2	100	107
Población General	9,2	90,8	100	9875	10,5	89,5	100	11775	8,6	91,4	100	11775
Población gitana (IC95%)	11,6 (9,1-14,9)	88,4 (85,3-95,2)	100	466	15,4 (12,5-18,7)	84,6 (81,3-87,5)	100	527	12,2 (9,6-15,3)	87,8 (84,7-90,4)	100	527

**Tabla 13.1b.** Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Durante los últimos doce meses ¿ha estado el niño/a hospitalizado como paciente al menos una noche?			
		Sí	No	Total	
		%	%	%	N (No Ponderado)
Niños	Clase I	7,4	92,6	100	303
	Clase II	4,0	96,0	100	377
	Clase III	7,6	92,4	100	757
	Clase IVa	7,2	92,8	100	1002
	Clase IVb	7,5	92,5	100	448
	Clase V	8,1	91,9	100	382
	Otros	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	10
	Población General	7,0	93,0	100	3307
	Población gitana (IC95%)	9,5 (6,4-13,6)	90,5 (86,4-93,6)	100	265
Niñas	Clase I	1,8	98,2	100	290
	Clase II	6,6	93,4	100	366
	Clase III	4,7	95,3	100	726
	Clase IVa	5,0	95,0	100	950
	Clase IVb	3,8	96,2	100	427
	Clase V	6,1	93,9	100	354
	Otros	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	14
	Población General	4,7	95,3	100	3156
	Población gitana (IC95%)	10,2 (6,7-14,5)	89,8 (85,5-93,3)	100	237

La mayor frecuencia de hospitalizaciones en la población gitana se encuentra en los hombres de más edad y en las mujeres de algunos grupos de edad. La razón de proporciones en los hombres de más de 55 años es 2,3 esto es, más del doble de probabilidad de haber estado hospitalizado en los hombres gitanos que en los de la población general. Esta razón alcanza el 2,4 entre las mujeres de 16 a 24 años y también en las de 0 a 4 años.

**Tabla 13.2a.** Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

	Hombres				Mujeres							
	Durante los últimos doce meses ¿ha estado hospitalizado como paciente al menos durante una noche?				Durante los últimos doce meses ¿ha estado hospitalizado como paciente al menos durante una noche?				Hospitalizaciones (sin contar partos)			
	Sí	No	Total	Total	Sí	No	Total	Total	Sí	No	Total	Total
	%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	N (No Ponderado)
<b>De 16 a 24 años</b>												
Clase I	6,1	93,9	100	69	,0	100	100	70	,0	100	100	70
Clase II	7,2	92,8	100	105	3,6	96,4	100	90	3,6	96,4	100	90
Clase III	5,0	95,0	100	257	3,3	96,7	100	220	3,2	96,8	100	220
Clase IVa	3,9	96,1	100	326	6,2	93,8	100	330	5,3	94,7	100	330
Clase IVb	4,5	95,5	100	149	1,7	98,3	100	154	1,0	99,0	100	154
Clase V	6,9	93,1	100	134	4,1	95,9	100	146	3,5	96,5	100	146
Población General	5,0	95,0	100	1060	3,8	96,2	100	1032	3,3	96,7	100	1032
Población gitana (IC95%)	6,7 (3,4-11,5)	93,3 (88,5-96,6)	100	151	13,5 (8,6-19,9)	86,5 (80,1-91,4)	100	138	7,9 (4,2-13,1)	92,1 (86,9-95,8)	100	138
<b>De 25 a 34 años</b>												
Clase I	7,3	92,7	100	110	11,3	88,7	100	148	4,8	95,2	100	148
Clase II	4,1	95,9	100	165	10,3	89,7	100	160	5,0	95,0	100	160
Clase III	4,3	95,7	100	366	15,4	84,6	100	403	7,3	92,7	100	403
Clase IVa	4,9	95,1	100	485	12,3	87,7	100	522	5,7	94,3	100	522
Clase IVb	6,3	93,7	100	220	10,1	89,9	100	248	3,2	96,8	100	248
Clase V	6,5	93,5	100	192	13,8	86,2	100	172	9,8	90,2	100	172
Población General	5,3	94,7	100	1559	12,6	87,4	100	1681	6,1	93,9	100	1681
Población gitana (IC95%)	5,6 (2,5-11,9)	94,4 (88,1-97,5)	100	97	14,1 (8,8-20,4)	85,9 (79,6-91,2)	100	140	11,2 (6,5-17,0)	88,8 (83,0-93,5)	100	140
<b>De 35 a 54 años</b>												
Clase I	7,8	92,2	100	340	7,0	93,0	100	383	4,9	95,1	100	383
Clase II	7,6	92,4	100	445	10,0	90,0	100	436	7,7	92,3	100	436
Clase III	6,6	93,4	100	930	8,0	92,0	100	922	5,9	94,1	100	922
Clase IVa	8,9	91,1	100	1151	8,6	91,4	100	981	6,9	93,1	100	981
Clase IVb	9,0	91,0	100	432	8,6	91,4	100	498	7,5	92,5	100	498
Clase V	9,0	91,0	100	407	6,6	93,4	100	411	5,5	94,5	100	411
Población General	8,1	91,9	100	3747	8,2	91,8	100	3679	6,5	93,5	100	3679
Población gitana (IC95%)	10,5 (6,2-15,8)	89,5 (84,2-93,8)	100	152	15,0 (10,2-21,1)	85,0 (78,9-89,8)	100	168	11,8 (7,7-17,7)	88,2 (82,3-92,3)	100	168
<b>De 55 y más años</b>												
Clase I	11,2	88,8	100	170	9,9	90,1	100	246	9,9	90,1	100	246
Clase II	17,2	82,8	100	247	14,9	85,1	100	327	14,9	85,1	100	327
Clase III	12,4	87,6	100	1059	13,3	86,7	100	1592	13,3	86,7	100	1592
Clase IVa	16,4	83,6	100	1151	14,7	85,3	100	1447	14,7	85,3	100	1447
Clase IVb	21,9	78,1	100	389	12,1	87,9	100	750	12,1	87,9	100	750
Clase V	16,3	83,7	100	439	17,3	82,7	100	909	17,3	82,7	100	909
Otros	10,3	89,7	100	44	10,2	89,8	100	53	10,2	89,8	100	53
No consta	,0	100	100	10	9,0	91,0	100	59	9,0	91,0	100	59
Población General	15,5	84,5	100	3509	14,0	86,0	100	5383	14,0	86,0	100	5383
Población gitana (IC95%)	35,6 (24,0-47,2)	64,4 (52,8-76,0)	100	66	21,5 (14,1-31,4)	78,5 (68,6-85,9)	100	81	21,5 (14,1-31,4)	78,5 (68,6-85,9)	100	81

**Tabla 13.2b.** Hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo.

**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Niños				Niñas			
		Durante los últimos doce meses ¿ha estado el niño/a hospitalizado como paciente al menos una noche?				Durante los últimos doce meses ¿ha estado el niño/a hospitalizado como paciente al menos una noche?			
		Si	No	Total		Si	No	Total	
		%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	N (No Ponderado)
De 0 a 4 años	Clase I	19,5	80,5	100	79	3,1	96,9	100	82
	Clase II	7,2	92,8	100	105	14,2	85,8	100	105
	Clase III	9,8	90,2	100	170	5,2	94,8	100	198
	Clase IVa	12,1	87,9	100	267	9,3	90,7	100	234
	Clase IVb	9,9	90,1	100	125	10,1	89,9	100	103
	Clase V	11,3	88,7	100	105	11,4	88,6	100	93
	Otros	-	-	-	10	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	5	-	-	-	6
	Población General	11,4	88,6	100	866	8,6	91,4	100	828
	Población gitana (IC95%)	13,1 (6,7-21,3)	86,9 (78,7-93,3)	100	80	20,4 (11,9-30,5)	79,6 (69,5-88,1)	100	67
De 5 a 9 años	Clase I	4,1	95,9	100	94	2,4	97,6	100	96
	Clase II	1,8	98,2	100	106	1,6	98,4	100	97
	Clase III	7,8	92,2	100	215	6,6	93,4	100	203
	Clase IVa	7,1	92,9	100	259	5,3	94,7	100	264
	Clase IVb	10,5	89,5	100	128	1,8	98,2	100	123
	Clase V	12,4	87,6	100	92	1,6	98,4	100	86
	Otros	-	-	-	2	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	2	-	-	-	5
	Población General	7,3	92,7	100	898	3,9	96,1	100	881
	Población gitana (IC95%)	11,1 (5,3-19,7)	88,9 (80,3-94,7)	100	77	8,4 (3,3-15,6)	91,6 (84,4-96,7)	100	77
De 10 a 15 años	Clase I	2,2	97,8	100	130	,1	99,9	100	112
	Clase II	3,6	96,4	100	166	4,4	95,6	100	164
	Clase III	6,4	93,6	100	372	3,0	97,0	100	325
	Clase IVa	4,1	95,9	100	476	2,4	97,6	100	452
	Clase IVb	3,2	96,8	100	195	1,7	98,3	100	201
	Clase V	4,3	95,7	100	185	5,7	94,3	100	175
	Otros	-	-	-	16	-	-	-	15
	No consta	-	-	-	3	-	-	-	3
	Población General	4,3	95,7	100	1543	2,9	97,1	100	1447
	Población gitana (IC95%)	5,8 (2,3-11,1)	94,2 (88,9-97,7)	100	108	3,7 (0,9-8,7)	96,3 (91,3-99,1)	100	93

El porcentaje de población hospitalizada en la población gitana crece rápidamente con la edad. En el caso de los hombres gitanos de más de 55 años un 35,6%, más de uno de cada tres, ha sido hospitalizado en el año anterior. En las mujeres gitanas se alcanza el 21,5% después de los 55 años, esto es, más de una de cada cinco. Consecuentemente el porcentaje de hospitalizaciones es también más alto en aquellas categorías que concentran población de más edad: las personas con menor nivel educativo y las jubiladas. En el modelo de regresión logística (tabla 13.3b) sólo la edad produce un efecto significativo en la probabilidad de hospitalización (pero no la educación o el tipo de vivienda).

**Tabla 13.3a.** Hospitalización. Población Gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio, según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

	Hombres				Mujeres							
	Durante los últimos doce meses ¿ha estado hospitalizado como paciente al menos durante una noche?				Durante los últimos doce meses ¿ha estado hospitalizado como paciente al menos durante una noche?				Hospitalizaciones (sin contar partos)			
	Sí	No	Total	Total	Sí	No	Total	Total	Sí	No	Total	Total
	%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)
<b>Edad</b>												
De 16 a 24 años	6,7	93,3	100	151	13,5	86,5	100	138	7,9	92,1	100	138
De 25 a 34 años	5,6	94,4	100	97	14,1	85,9	100	140	11,2	88,8	100	140
De 35 a 54 años	10,5	89,5	100	152	15,0	85,0	100	168	11,8	88,2	100	168
De 55 y más años	35,6	64,4	100	66	21,5	78,5	100	81	21,5	78,5	100	81
Total	11,6	88,4	100	466	15,4	84,6	100	527	12,2	87,8	100	527
<b>Nivel de estudios</b>												
No sabe leer y escribir	26,9	73,1	100	40	20,5	79,5	100	84	20,5	79,5	100	84
Leer y escribir /primarios incompletos	11,8	88,2	100	242	12,2	87,8	100	282	8,8	91,2	100	282
Primarios completos	10,9	89,1	100	86	22,4	77,6	100	73	16,8	83,2	100	73
Secundarios o superiores	6,4	93,6	100	82	14,8	85,2	100	70	10,7	89,3	100	70
Total	11,9	88,1	100	450	15,5	84,5	100	509	12,1	87,9	100	509
<b>Situación ocupacional</b>												
Trab. cuenta ajena Fijo/a	5,9	94,1	100	48	9,6	90,4	100	40	9,6	90,4	100	40
Trab. cuenta ajena Temporal	6,6	93,4	100	98	10,9	89,1	100	82	6,9	93,1	100	82
Trab. cuenta propia Autónomo/a o Empresario/a	7,4	92,6	100	81	15,3	84,7	100	42	13,8	86,2	100	42
Ayuda familiar	1,8	98,2	100	46	18,1	81,9	100	37	14,4	85,6	100	37
Parado/a ha trabajado antes	12,5	87,5	100	82	19,7	80,3	100	55	15,8	84,2	100	55
Parado/a busca primer empleo	7,2	92,8	100	32	-	-	-	21	-	-	-	21
Estudiante	-	-	-	10	-	-	-	11	-	-	-	11
Jubilado/a	39,3	60,7	100	68	19,5	80,5	100	66	19,5	80,5	100	66
Labores del hogar	-	-	-	1	16,3	83,7	100	173	10,8	89,2	100	173
Total	11,6	88,4	100	466	15,4	84,6	100	527	12,2	87,8	100	527
<b>Tipo de vivienda</b>												
Normalizada	11,2	88,8	100	426	15,4	84,6	100	486	12,5	87,5	100	486
Infravivienda/chabola	16,9	83,1	100	39	17,9	82,1	100	37	10,3	89,7	100	37
Total	11,6	88,4	100	465	15,6	84,4	100	523	12,3	87,7	100	523
<b>Barrio con servicios de salud</b>												
Sí	11,8	88,2	100	422	15,7	84,3	100	476	12,2	87,8	100	476
No	10,0	90,0	100	43	13,6	86,4	100	47	13,6	86,4	100	47
Total	11,6	88,4	100	465	15,6	84,4	100	523	12,3	87,7	100	523
<b>Situación del barrio</b>												
Integrado y buenas condiciones	11,7	88,3	100	327	15,7	84,3	100	377	12,9	87,1	100	377
Integrado y malas condiciones	10,4	89,6	100	54	12,7	87,3	100	58	7,1	92,9	100	58
Alejado y buenas condiciones	13,3	86,7	100	52	21,8	78,2	100	49	17,3	82,7	100	49
Alejado y malas condiciones	10,8	89,2	100	32	10,6	89,4	100	39	8,1	91,9	100	39
Total	11,6	88,4	100	465	15,6	84,4	100	523	12,3	87,7	100	523

**Tabla 13.3b.** Hospitalización (sin partos). Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

**Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.**

		Variable y (durante los últimos 12 meses ¿ha estado hospitalizada/o como paciente al menos durante una noche?) (1= sí; 0= no)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic. Odds Ratio 95%				Ic. Odds Ratio 95%	
		SIG.	ODDS RATIO AJUSTADA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	SIG.	ODDS RATIO AJUSTADA	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Edad		,000	1,056	1,036	1,077	,046	1,019	1,000	1,039
Educación	No sabe leer y escribir	,785				,083			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,411	,679	,269	1,710	,066	,493	,232	1,048
	Primarios completos	,896	,926	,295	2,911	,787	1,136	,450	2,870
	Secundarios o superiores	,623	,724	,199	2,627	,617	,761	,261	2,218
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,274	1,809	,626	5,229	,510	,648	,178	2,359

No existe una diferencia significativa en el número de días de hospitalización entre población gitana y la población general, ni siquiera en el caso de la población masculina en la que se observan 5,5 días de diferencia (IC95% -3,5-14'5 días,  $p=0,227$ ).

En el caso de la población menor de 15 años se ha optado por agrupar los datos de niños y niñas al haberse obtenido un bajo número de casos de hospitalización a partir de los cuales calcular el número de días de hospitalización, tampoco se obtienen diferencias estadísticamente significativas en las medias.

**Tabla 13.4a.** Días de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

**Media, mediana, número de casos, error típico de la media y desviación típica. Población de 16 y más años. Valores ponderados.**

		Y en relación a su último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses ¿cuántos días aproximadamente estuvo ingresado/a en el hospital?				
		Media	Mediana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica
Hombres	Clase I	10,8	4	69	2,28	18,96
	Clase II	7,3	4	96	1,00	9,77
	Clase III	9,4	4	199	1,17	16,52
	Clase IVa	8,4	4	333	,67	12,18
	Clase IVb	8,8	3	141	1,25	14,84
	Clase V	6,6	4	128	,58	6,61
	Otros	-	-	5	-	-
	No consta	-	-	2	-	-
	Población General	8,5	4	974	,43	13,40
Población gitana (IC95%)	14,0 (4,9-23,0)	4	52	4,48	32,36	
Mujeres	Clase I	4,7	3	73	,69	5,88
	Clase II	6,7	4	110	,62	6,56
	Clase III	7,9	4	301	,68	11,72
	Clase IVa	7,5	3	359	,94	17,72
	Clase IVb	7,4	4	132	1,06	12,14
	Clase V	8,2	6	171	,72	9,49
	Otros	-	-	7	-	-
	No consta	-	-	7	-	-
	Población General	7,4	4	1160	,38	13,03
Población gitana (IC95%)	9,0 (4,1-14,0)	3	82	2,47	22,32	

**Tabla 13.4b.** Días de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Niños y niñas.

**Media, mediana, número de casos, error típico de la media y desviación típica. Población de 15 y menos años. Valores ponderados.**

	Y en relación a su último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses ¿cuántos días estuvo aproximadamente ingresado el niño/a en el hospital?				
	Media	Mediana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica
Clase I	14,2	4	32	5,94	33,46
Clase II	3,1	2	40	,44	2,80
Clase III	5,1	3	87	,80	7,46
Clase IVa	3,6	2	116	,32	3,42
Clase IVb	10,6	5	51	3,65	26,05
Clase V	5,4	4	56	,70	5,24
Otros	-	-	1	-	-
No consta	-	-	1	-	-
Población General	6,0	3	383	,74	14,53
Población gitana (IC95%)	7,3 (5,0-9,6)	5	47	1,13	7,77

Los motivos de hospitalización en los hombres difieren en la población gitana y en la población general. Mientras que en los hombres gitanos no existe un motivo principal de hospitalización claramente diferenciado (se distribuyen de forma similar entre intervención quirúrgica, estudio médico para diagnóstico, tratamiento sin cirugía y otros motivos), en la población general hay una clara ordenación de los motivos de ingreso: en primer lugar la intervención quirúrgica, seguida el tratamiento médico sin intervención quirúrgica y el estudio médico para diagnóstico y tiene muy poca importancia la categoría inespecífica “otros motivos”. Esta diferencia entre población gitana y población entrevistada en la Encuesta Nacional de Salud se observa tanto con las clases sociales ocupacionales mejor situadas como con aquellas situadas en los peores niveles de la jerarquía ocupacional.

En el caso de las mujeres sin embargo las pautas entre población gitana y la población general se aproximan mucho más.

En los menores de 15 y menos años no se ha desagregado la información por sexo al contar con un bajo porcentaje de menores que hayan pasado alguna noche en el hospital. En cualquier caso se observa una pauta diferenciada entre población gitana y la población general. En el caso de las niñas, niños y adolescentes de la población gitana ganan relevancia en términos relativos las hospitalizaciones sin intervención quirúrgica y las de la categoría “otras causas”, mientras que en la población general tienen más peso las intervenciones quirúrgicas y el estudio médico para diagnóstico.

**Tabla 13.5a.** Motivo de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		En relación también a este último ingreso hospitalario ¿cuál fue el motivo de su ingreso en el hospital?							
		Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total		
		%	%	%	%	%	%	N (No ponderado)	
Hombres	Clase I	45,0	22,1	32,4	-	,6	100	59	
	Clase II	53,2	10,5	34,2	-	2,0	100	79	
	Clase III	55,8	19,7	20,8	-	3,7	100	225	
	Clase IVa	53,6	18,8	24,0	-	3,6	100	331	
	Clase IVb	52,6	18,4	22,8	-	6,3	100	131	
	Clase V	49,1	23,7	23,2	-	4,1	100	117	
	Otros	-	-	-	-	-	-	10	
	No consta	-	-	-	-	-	-	2	
	Población General	52,6	19,3	24,5	-	3,7	100	954	
Población gitana (IC95%)	26,9 (16,0-39,4)	24,7 (15,5-37,3)	25,7 (15,5-37,3)	-	22,7 (13,0-35,2)	100	52		
Mujeres	Clase I	39,0	3,6	24,1	29,8	3,6	100	71	
	Clase II	49,1	15,5	15,0	18,5	1,9	100	106	
	Clase III	44,4	14,3	17,1	19,9	4,3	100	341	
	Clase IVa	47,3	16,8	13,1	18,5	4,3	100	392	
	Clase IVb	45,3	18,1	12,5	19,4	4,8	100	171	
	Clase V	44,1	20,4	23,4	8,8	3,3	100	222	
	Otros	-	-	-	-	-	-	10	
	No consta	-	-	-	-	-	-	12	
	Población General	45,4	15,8	16,7	18,2	3,9	100	1325	
Población gitana (IC95%)	36,2 (26,7-47,7)	20,5 (12,5-30,1)	18,1 (10,5-27,3)	18,2 (10,5-27,3)	7,0 (3,2-15,0)	100	79		

**Tabla 13.5b.** Motivo de hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

	En relación también a este último ingreso hospitalario ¿cuál fue el motivo del ingreso del niño/a en el hospital?					¿Estuvo en lista de espera por este motivo?				
	Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Otros motivos	Total	Sí	No	Total		
	%	%	%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)	
Clase I	18,4	15,7	61,2	4,7	100	30	14,7	85,3	100	30
Clase II	16,5	30,1	51,6	1,8	100	42	10,1	89,9	100	42
Clase III	31,8	35,9	22,5	9,8	100	81	24,4	75,6	100	81
Clase IVa	33,3	40,1	19,0	7,6	100	119	22,6	77,4	100	119
Clase IVb	34,9	30,1	28,4	6,6	100	53	15,0	85,0	100	53
Clase V	27,8	39,5	22,6	10,2	100	44	18,9	81,1	100	44
Otros	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
No consta	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Población General	29,2	34,8	28,6	7,5	100	374	19,4	80,6	100	374
Población gitana (IC95%)	14,8 (6,9-27,1)	19,9 (9,9-32,1)	41,8 (29,2-56,8)	23,4 (13,1-36,9)	100	47	12,5 (5,3-24,0)	87,5 (76,0-94,7)	100	48

El porcentaje de personas que ha estado en lista de espera en la población gitana es similar al de la población general, tanto en hombres como en mujeres. La población gitana se encuentra entre los grupos sociales con menor porcentaje de personas en lista de espera, si bien los datos no se muestran desagregados por edad, debido al bajo número en la muestra de personas entrevistadas que hayan estado hospitalizadas.

**Tabla 13.6.** Lista de espera. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

	Hombres				Mujeres			
	¿Estuvo en lista de espera por este motivo?				¿Estuvo en lista de espera por este motivo?			
	Sí	No	Total		Sí	No	Total	
	%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	N (No Ponderado)
Clase I	15,1	84,9	100	59	10,0	90,0	100	54
Clase II	21,0	79,0	100	79	13,4	86,6	100	87
Clase III	28,8	71,2	100	225	19,6	80,4	100	286
Clase IVa	31,6	68,4	100	331	34,4	65,6	100	324
Clase IVb	25,1	74,9	100	131	34,4	65,6	100	150
Clase V	27,9	72,1	100	117	25,6	74,4	100	201
Otros	-	-	-	10	-	-	-	8
No consta	-	-	-	2	-	-	-	10
Población General	27,4	72,6	100	954	25,7	74,3	100	1120
Población gitana (IC95%)	14,3 (7,4-26,5)	85,7 (73,5-92,6)	100	52	19,0 (12,0-29,1)	81,0 (70,9-88,0)	100	81

La cobertura de la hospitalización en España es fundamentalmente pública (por el sistema nacional de salud). En la población gitana esta protección pública es todavía más marcada, sobre todo en las mujeres y entre la población menor de 15 años. Los sistemas de protección a través de mutualidades o sociedades médicas apenas tienen presencia en la población gitana. En el caso de los hombres adultos, aunque el porcentaje es bajo (3,8%), se encuentran algunos casos de cobertura por pago directo.

**Tabla 13.7a.** Cobertura de la hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		¿A cargo de quién corrieron los gastos de su hospitalización?						Total	
		Seguridad social	Mutualidad obligatoria (muface, isfas, etc.)	Sociedad médica privada	A su propio cargo o de su hogar	A cargo de otras personas, organismos o instituciones			
		%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)	
Hombres	Clase I	63,2	14,9	18,3	1,2	2,4	100	59	
	Clase II	59,0	9,4	23,3	8,1	,2	100	79	
	Clase III	73,5	8,0	9,6	5,0	3,9	100	225	
	Clase IVa	92,3	1,8	3,7	,4	1,8	100	331	
	Clase IVb	94,3	,0	2,1	2,0	1,5	100	131	
	Clase V	98,1	,0	,3	,0	1,5	100	117	
	Otros	-	-	-	-	-	100	10	
	No consta	-	-	-	-	-	100	2	
	Población General	83,8	4,6	7,2	2,3	2,1	100	954	
	Población gitana (IC95%)	91,5 (80,5-96,4)	1,9 (0,2-8,5)	1,5 (0,2-8,5)	3,8 (0,7-11,6)	1,2 (0,2-8,5)	100	52	
Mujeres	Clase I	55,5	2,2	42,1	,0	,2	100	71	
	Clase II	61,0	7,3	27,2	4,5	,0	100	106	
	Clase III	75,7	6,7	16,4	1,2	,0	100	341	
	Clase IVa	91,6	,5	5,2	2,5	,2	100	392	
	Clase IVb	88,9	,6	8,0	2,6	,0	100	171	
	Clase V	92,7	1,4	3,3	1,5	1,1	100	222	
	Otros	-	-	-	-	-	100	10	
	No consta	-	-	-	-	-	100	12	
	Población General	81,6	3,6	12,5	2,0	,2	100	1325	
	Población gitana (IC95%)	97,5 (92,4-99,5)	,0 (0,0-3,1)	1,9 (0,5-7,6)	,5 (0,0-3,1)	,0 (0,0-3,1)	100	81	

**Tabla 13.7b.** Cobertura de la hospitalización. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		¿A CARGO DE QUIÉN CORRIERON LOS GASTOS DE SU HOSPITALIZACIÓN?					Total	
		Seguridad Social	Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.)	Sociedad médica privada	A cargo del hogar	A cargo de otras personas, organismos, instituciones		
		%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Clase I	61,9	8,0	23,2	6,8	,0	100	30	
Clase II	62,2	12,1	19,7	4,5	1,5	100	42	
Clase III	84,1	4,1	10,9	,0	,8	100	81	
Clase IVa	91,0	,0	4,8	,0	4,3	100	119	
Clase IVb	95,3	1,8	2,8	,0	,0	100	53	
Clase V	99,7	,0	,0	,3	,0	100	44	
Otros	-	-	-	-	-	-	4	
No consta	-	-	-	-	-	-	1	
Población General	85,5	3,5	8,3	1,1	1,6	100	374	
Población gitana (IC95%)	98,1 (90,6-99,8)	,0 (0,0-5,1)	1,9 (0,2-9,4)	,0 (0,0-5,1)	,0 (0,0-5,1)	100	48	

**13.3 Resumen de resultados**

En la población gitana se producen más hospitalizaciones que en la población general en términos agregados. En algunos grupos (mujeres jóvenes y hombres de edad avanzada) las hospitalizaciones de población gitana duplican las de la población general.

El porcentaje de hospitalizaciones crece de forma muy rápida con la edad en la población gitana.

Los motivos de hospitalización en los hombres y en la población menor de 15 años difieren en la población gitana y en la población general, lo que sugiere pautas diferenciadas de exposición a la enfermedad y de transformación de las necesidades de salud en demandas de salud.

La cobertura de la hospitalización es fundamentalmente pública en la población gitana, en especial para población menor de 15 años y mujeres y no se detectan problemas destacados (en términos relativos) de listas de espera.

- Un 11,6% de los hombres gitanos ha sido hospitalizado en el último año, un 10,4% en los hombres de clase social V y un 8,3% en clase social I. En las mujeres, sin contar partos: mujeres gitanas (12,2%), 10,9% (clase V) y 5,4% (clase I).
- El porcentaje de hospitalizaciones crece de forma muy rápida con la edad en la población gitana.

### **13.4 Prioridades de intervención.**

- Mejorar la atención a la salud en los niveles de atención primaria y especializada para evitar un tratamiento hospitalario en estadios más desarrollados de la enfermedad.
- Actuar sobre los factores sociales que producen una mayor necesidad de servicios hospitalarios en la población gitana.

### **13.5 Prioridades de investigación.**

Estudiar de forma integral el acceso de la población gitana a los servicios de salud hospitalarios atendiendo tanto a el sistema de derivación en el interior del sistema de salud (desde la atención primaria a la hospitalaria, servicios de urgencia), como al proceso previo de exposición a enfermedades, autodiagnóstico y búsqueda de ayuda profesional.