

16 Consumo de medicamentos

Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades Intervención
- Prioridades Investigación

Índice de tablas

Tabla 16.1a. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Hombres.

Tabla 16.1b. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Mujeres.

Tabla 16.1c. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Niños.

Tabla 16.1d. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Niñas.

16.1 Introducción

La garantía del acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de las enfermedades es uno de los elementos en los que se fundamenta el derecho a la atención sanitaria.

Si bien una utilización adecuada puede ser útil para la mejora de la salud de la población, el consumo de medicamentos puede producir importantes efectos adversos, en especial, cuando se combina el consumo de varios de ellos.

Por otro lado, cuando el tratamiento que se sigue no es el adecuado (por ejemplo, el incumplimiento terapéutico), además de los posibles efectos adversos se pueden producir problemas adicionales como mayores dificultades al hacer nuevos diagnósticos y complicaciones a la hora de recibir nuevos tratamientos.

Por ejemplo, el uso de antibióticos no resulta efectivo en el tratamiento de problemas como la gripe o los resfriados porque estos son de origen vírico. El uso de los antibióticos para el tratamiento de la gripe o el resfriado reduce su eficacia en el futuro.

La automedicación es por tanto un importante problema para la salud. El personal médico es quien debe diagnosticar la enfermedad y recomendar el tratamiento más adecuado. En este sentido la exigencia de la receta médica debe entenderse siempre como un mecanismo para proteger y garantizar la seguridad de las personas que consumen medicamentos.

16.2 Resultados detallados

Cuando se compara con la población entrevistada en la Encuesta Nacional de Salud de 2003 se observa que la población gitana consume más medicamentos que la población general de España. En el caso de los medicamentos para el dolor y/o bajar la fiebre o los destinados al catarro, gripe, garganta o bronquios (sin contar antibióticos) el consumo en los hombres gitanos es superior al doble del consumo habitual en la población general de España.

Precisamente estos medicamentos son los que se consumen en mayor proporción sin haber recibido receta médica en el caso de la población gitana masculina adulta (los indicados para el dolor y bajar la fiebre y los relacionados con el catarro, la gripe, la garganta o los bronquios). Los niveles de automedicación en la población gitana masculina adulta son muy similares a los que se encuentran en la población general.

La población gitana masculina consume por orden de mayor a menor frecuencia medicamentos para el dolor y/o bajar la fiebre (28% los ha consumido en las dos últimas semanas), el catarro, gripe, garganta o bronquios (sin contar antibióticos) (26,8%), tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir (11,7%), antibióticos (10,3%) y tensión arterial (10,1%).

Estos medicamentos son también los que más han sido recetados, si bien los medicamentos para la tensión arterial pasarían de la quinta posición en términos de consumo, a la tercera cuando se ordenan de más a menos recetados.

Tabla 16.1a. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

Pregunta: "durante las últimas 2 semanas ¿ha consumido los siguientes medicamentos y le fueron recetados en algún momento por el médico?. No incluya medicamentos homeopáticos o naturales".

"Consumo" % que ha consumido medicamentos para:		Clase i	Clase ii	Clase iii	Clase iva	Clase ivb	Clase v	Población general	Población gitana
"Receta" % Al Que Le Han Recetado Medicamentos para:		%	%	%	%	%	%	%	% (IC95%)
Consumo: Catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto	Sí	8,6	11,4	10,0	11,7	11,7	14,2	11,3	26,8 (23,0-
Receta: Catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto	Sí	3,4	5,6	5,1	6,5	6,7	8,1	6,0	13,7 (10,7-
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>2,6</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,8</i>	<i>1,9</i>	<i>2,0</i>
Consumo: Dolor y/o bajar fiebre	Sí	15,7	14,5	13,3	14,4	16,4	16,6	14,7	28,0 (24,0-
Receta: Dolor y/o bajar fiebre	Sí	6,0	6,5	7,6	9,3	9,4	9,7	8,4	14,3 (11,3-
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>2,6</i>	<i>2,2</i>	<i>1,7</i>	<i>1,5</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,8</i>	<i>2,0</i>
Consumo: Reconstituyentes como vitaminas, minerales,	Sí	4,5	4,4	2,4	1,9	2,7	2,5	2,7	2,9 (1,7-4,9)
Receta: Reconstituyentes como vitaminas, minerales,	Sí	1,2	2,2	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	2,1 (1,1-3,8)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>3,6</i>	<i>2,1</i>	<i>2,4</i>	<i>1,6</i>	<i>2,3</i>	<i>2,0</i>	<i>2,2</i>	<i>1,4</i>
Consumo: laxantes	Sí	0,0	0,7	0,9	0,6	0,4	0,6	0,6	1,9 (0,9-3,5)
Receta: laxantes	Sí	0,0	0,5	0,7	0,4	0,3	0,6	0,5	1,6 (0,8-3,2)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>-</i>	<i>1,5</i>	<i>1,4</i>	<i>1,5</i>	<i>1,3</i>	<i>1,0</i>	<i>1,3</i>	<i>1,1</i>
Consumo: antibióticos	Sí	2,0	1,7	2,2	3,6	3,2	3,9	2,9	10,3 (7,7-
Receta: Antibióticos	Sí	1,8	1,5	1,5	3,1	2,8	3,1	2,4	8,8 (6,4-11,6)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,5</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
Consumo: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	4,7	5,3	3,9	4,6	5,0	5,4	4,7	11,7 (9,0-
Receta: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	3,3	4,4	3,3	4,1	4,5	5,0	4,1	8,2 (5,9-10,9)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>
Consumo: Alergia	Sí	3,3	3,2	2,7	2,7	3,4	2,7	2,9	4,6 (3,0-6,9)
Receta: Alergia	Sí	2,3	3,1	2,3	2,4	3,2	2,3	2,5	3,8 (2,3-5,9)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,4</i>	<i>1,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>
Consumo: Diarrea	Sí	0,3	0,3	0,1	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3 (0,0-1,4)
Receta: Diarrea	Sí	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,3 (0,0-1,4)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>2,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>3,8</i>	<i>2,1</i>	<i>1,4</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Reuma	Sí	1,6	1,7	2,1	1,7	1,6	2,2	1,8	2,6 (1,4-4,3)
Receta: Reuma	Sí	1,3	1,4	2,1	1,7	1,5	2,0	1,8	2,8 (1,5-4,6)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>0,9</i>
Consumo: Corazón	Sí	3,9	5,1	5,6	5,8	5,7	5,3	5,4	3,3 (1,8-5,1)
Receta: Corazón	Sí	3,9	5,0	5,5	5,6	5,6	5,3	5,3	3,1 (1,8-5,1)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>
Consumo: tensión arterial	Sí	10,2	10,0	11,8	11,7	11,1	9,6	11,1	10,1 (7,5-
Receta: Tensión arterial	Sí	9,8	9,9	11,6	11,2	10,4	9,0	10,7	10,5 (7,9-
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Alteraciones digestivas	Sí	5,5	4,5	5,2	5,7	3,1	5,8	5,1	9,0 (6,6-11,9)
Receta: Alteraciones digestivas	Sí	3,2	3,0	3,8	4,9	2,7	4,9	4,0	5,5 (3,7-8,0)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,8</i>	<i>1,5</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,3</i>	<i>1,6</i>
Consumo: Antidepresivos, estimulantes	Sí	1,4	1,2	1,8	1,5	1,8	2,8	1,7	5,3 (3,5-7,7)
Receta: Antidepresivos, estimulantes	Sí	1,4	1,2	1,8	1,3	1,7	2,5	1,6	5,0 (3,2-7,2)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
Consumo: Adelgazar	Sí	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,8 (0,2-2,1)
Receta: Adelgazar	Sí	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0 (0,0-0,6)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>2,5</i>	<i>-</i>
Consumo: Colesterol	Sí	4,9	6,4	5,1	6,0	5,3	5,9	5,6	5,8 (3,9-8,2)
Receta: Colesterol	Sí	4,0	6,4	5,1	5,8	4,7	5,9	5,4	5,9 (3,9-8,2)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Diabetes	Sí	2,2	3,9	4,4	5,2	5,0	5,2	4,6	2,6 (1,4-4,3)
Receta: Diabetes	Sí	2,2	3,9	4,4	5,1	4,8	5,0	4,6	2,4 (1,4-4,3)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>
Consumo: Otros	Sí	10,1	13,2	15,2	15,2	12,8	14,9	14,3	4,4 (2,7-6,4)
Receta: Otros	Sí	8,6	11,0	14,0	13,6	10,8	13,0	12,6	3,3 (2,0-5,4)
	<i>Ratio consumo/receta</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,3</i>

El nivel de consumo de medicamentos en las mujeres gitanas es mayor que en los hombres gitanos en algunas categorías. Los medicamentos que más se consumen son también por orden de mayor a menor frecuencia los indicados para el dolor y/o bajar la fiebre (42,9% los ha consumido en las dos últimas semanas), el catarro, gripe, garganta o bronquios (sin contar antibióticos) (25,2%), tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir (15,6%), tensión arterial (12%) y antibióticos (10,7%).

El orden de consumo coincide con el orden de frecuencia en la que han sido recetados, esto es, los medicamentos más consumidos son también los más recetados.

El nivel de consumo de medicamentos en las mujeres adultas gitanas es superior al de las mujeres de la población general para varios de dichos medicamentos.

La automedicación en las mujeres gitanas es ligeramente inferior que en los hombres y se trata de un problema compartido por la población gitana y la población general de España, sobre todo en los medicamentos para el catarro, gripe, garganta y bronquios y los indicados para el dolor o bajar la fiebre.

Tabla 16.1b. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

Pregunta: "durante las últimas 2 semanas ¿ha consumido los siguientes medicamentos y le fueron recetados en algún momento por el médico?. No incluya medicamentos homeopáticos o naturales"									
"Consumo" % que ha consumido medicamentos para:		Clase i	Clase ii	Clase iii	Clase iv a	Clase iv b	Clase v	Población general	Población gitana
"Receta" % al que le han recetado medicamentos para:		%	%	%	%	%	%	%	%
Consumo: Catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	Sí	8,9	9,4	9,3	10,4	10,5	11,1	10,0	25,2 (21,5-29,0)
Receta: Catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	Sí	4,7	3,3	5,2	6,1	6,8	7,4	5,7	14,3 (11,3-17,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,9	2,9	1,8	1,7	1,5	1,5	1,7	1,8
Consumo: Dolor y/o bajar fiebre	Sí	23,4	20,3	23,0	26,6	25,2	29,2	24,9	42,9 (38,6-46,1)
Receta: Dolor y/o bajar fiebre	Sí	9,9	10,9	14,2	17,5	16,1	21,1	15,6	28,3 (24,5-32,3)
<i>Ratio consumo/receta</i>		2,4	1,9	1,6	1,5	1,6	1,4	1,6	1,5
Consumo: Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	8,0	8,8	7,6	7,4	7,3	6,7	7,5	7,7 (5,6-10,3)
Receta: Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	3,8	5,3	6,2	5,6	5,2	5,4	5,4	6,1 (4,2-8,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		2,1	1,7	1,2	1,3	1,4	1,2	1,4	1,3
Consumo: laxantes	Sí	2,0	1,3	1,8	1,7	1,4	1,7	1,7	4,4 (2,8-6,4)
Receta: laxantes	Sí	1,4	0,2	0,8	1,0	0,7	1,1	0,9	3,5 (2,1-5,2)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,5	5,9	2,3	1,8	1,9	1,5	1,9	1,3
Consumo: antibióticos	Sí	2,3	3,5	3,6	3,8	4,2	4,5	3,7	10,7 (8,1-13,4)
Receta: Antibióticos	Sí	2,1	2,7	2,9	3,0	3,6	4,1	3,1	10,0 (7,6-12,8)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,1	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1
Consumo: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	7,6	8,8	11,4	11,5	13,1	14,8	11,6	15,6 (12,5-18,8)
Receta: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	6,4	8,2	10,1	10,7	12,3	13,1	10,5	13,6 (10,8-16,7)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Consumo: Alergia	Sí	3,1	3,0	3,1	3,5	3,1	3,2	3,2	4,2 (2,6-6,2)
Receta: Alergia	Sí	2,2	2,9	2,8	3,1	2,8	3,0	2,8	4,2 (2,6-6,2)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
Consumo: Diarrea	Sí	1,0	0,9	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8 (0,2-1,8)
Receta: Diarrea	Sí	1,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6 (0,1-1,5)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,0	1,7	1,1	1,0	1,0	1,3	1,1	1,3
Consumo: Reuma	Sí	2,5	1,8	5,7	5,3	4,7	6,7	4,9	7,2 (5,2-9,6)
Receta: Reuma	Sí	2,4	1,8	5,7	5,3	4,6	6,5	4,9	6,8 (4,8-9,2)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Consumo: Corazón	Sí	3,2	3,6	5,6	5,5	4,6	7,5	5,3	4,2(2,6-6,1)
Receta: Corazón	Sí	3,0	3,3	5,6	5,4	4,6	7,5	5,2	4,4 (2,8-6,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Consumo: tensión arterial	Sí	7,2	11,0	16,4	16,2	16,1	19,2	15,5	12,0 (9,3-14,9)
Receta: Tensión arterial	Sí	7,4	10,9	16,3	15,8	15,8	19,0	15,3	12,1 (9,5-15,1)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Consumo: Alteraciones digestivas	Sí	3,0	5,2	5,6	5,7	6,4	7,6	5,7	10,3 (7,8-13,0)
Receta: Alteraciones digestivas	Sí	2,6	4,8	4,7	5,2	5,2	7,1	5,1	8,8 (6,6-11,6)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2
Consumo: Antidepresivos, estimulantes	Sí	2,5	3,1	4,0	4,4	5,2	5,6	4,3	7,6 (5,6-10,3)
Receta: Antidepresivos, estimulantes	Sí	2,4	3,1	3,6	4,3	4,9	5,6	4,1	7,8 (5,8-10,5)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
Consumo: Píldoras para no quedar embarazada	Sí	3,5	2,0	2,4	3,8	3,1	2,8	3,0	8,1 (6,0-10,7)
Receta: Píldoras para no quedar embarazada	Sí	2,4	1,5	1,4	2,3	2,0	2,3	1,9	6,9 (5,0-9,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,4	1,3	1,7	1,6	1,5	1,2	1,5	1,2
Consumo: Medicamentos hormonales sustitutivos	Sí	2,0	2,5	2,4	2,0	1,7	1,6	2,0	1,2 (0,4-2,4)
Receta: Medicamentos hormonales sustitutivos	Sí	1,6	2,1	2,1	1,8	1,5	1,4	1,8	1,7 (0,8-3,1)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7
Consumo: Adelgazar	Sí	0,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,3	0,3	3,3 (2,1-5,2)
Receta: Adelgazar	Sí	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	1,4 (0,7-2,9)
<i>Ratio consumo/receta</i>		-	1,7	4,5	3,1	1,0	1,0	2,4	2,3
Consumo: Colesterol	Sí	4,6	3,6	7,2	6,7	7,8	9,7	6,9	5,6 (3,9-7,9)
Receta: Colesterol	Sí	4,4	3,5	7,2	6,5	7,6	9,8	6,8	6,1 (4,2-8,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
Consumo: Diabetes	Sí	2,7	3,0	4,9	4,8	6,4	8,0	5,2	4,4 (2,8-6,4)
Receta: Diabetes	Sí	2,7	3,0	4,9	4,7	6,4	8,0	5,1	4,6 (3,0-6,6)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Consumo: Otros	Sí	14,6	15,6	16,8	18,3	18,3	23,7	18,0	9,7 (7,3-12,4)
Receta: Otros	Sí	12,1	14,5	15,4	16,4	15,6	21,9	16,1	8,9 (6,6-11,6)
<i>Ratio consumo/receta</i>		1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2

En el caso de los niños y adolescentes menores de 15 años se mantiene la alta presencia de medicamentos para el catarro, gripe, garganta y bronquios (38,1%) que pasan al primer lugar, seguidos por medicamentos para el dolor y bajar la fiebre (31,3%), y a mayor distancia, de antibióticos (9,1%), los relacionados con la alergia (6,7%) y los reconstituyentes (3,5%).

Los más consumidos son también los medicamentos más recetados, siendo el nivel de consumo sin receta mucho menor que el que se observa en la población adulta y similar al que se observa en la población general de la misma edad.

Tabla 16.1c. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Niños.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

Pregunta: "durante las últimas 2 semanas ¿ha consumido el niño/a los siguientes medicamentos y le fueron recetados en algún momento por el médico?. No incluya medicamentos homeopáticos o naturales".

"Consumo" % que ha consumido medicamentos para:		Clase i	Clase ii	Clase iii	Clase iva	Clase ivb	Clase v	Población general	Población gitana
"Receta" % al que le han recetado medicamentos para:		%	%	%	%	%	%	%	% (ic95%)
Consumo: Medicamentos para el catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	Sí	10,5	15,4	13,7	15,7	16,5	18,9	15,1	38,1 (32,3-44,1)
Receta: Medicamentos para el catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	Sí	7,0	10,8	9,3	12,5	12,7	11,9	11,0	29,0 (23,9-35,0)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,5</i>	<i>1,4</i>	<i>1,5</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,6</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>
Consumo: Medicamentos para el dolor y/o bajar fiebre	Sí	13,3	10,9	10,2	10,5	14,1	8,8	11,1	31,3 (25,7-37,0)
Receta: Medicamentos para el dolor y/o bajar fiebre	Sí	8,5	7,3	7,5	7,6	10,2	7,2	8,0	25,3 (20,3-31,0)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>
Consumo: Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	5,4	4,2	3,8	3,9	4,9	2,2	4,0	3,5 (1,7-6,3)
Receta: Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	3,9	2,3	2,6	2,5	2,9	1,4	2,6	2,3 (0,9-4,7)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,4</i>	<i>1,9</i>	<i>1,5</i>	<i>1,6</i>	<i>1,7</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>1,5</i>
Consumo: laxantes	Sí	1,3	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,3	0,6 (0,1-2,5)
Receta: laxantes	Sí	1,3	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,3	0,6 (0,1-2,5)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,4</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Antibióticos	Sí	3,5	3,9	4,7	4,6	5,2	3,9	4,4	9,1 (6,1-13,2)
Receta: Antibióticos	Sí	3,0	3,9	4,3	4,5	4,5	3,9	4,2	7,7 (4,9-11,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>
Consumo: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	0,0	0,5	0,4	0,6	0,4	0,8	0,5	0,9 (0,1-2,5)
Receta: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	0,0	0,5	0,4	0,1	0,4	0,8	0,3	1,3 (0,3-3,1)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>4,6</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,4</i>	<i>0,7</i>
Consumo: Medicamentos para la alergia	Sí	4,2	4,2	4,5	3,2	6,3	5,6	4,4	6,7 (4,0-10,1)
Receta: Medicamentos para la alergia	Sí	3,9	4,2	4,3	2,9	5,5	5,1	4,1	6,3 (3,7-9,6)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
Consumo: Medicamentos para la diarrea	Sí	0,7	0,3	0,5	0,2	0,3	0,1	0,3	2,1 (0,7-4,2)
Receta: Medicamentos para la diarrea	Sí	0,7	0,1	0,5	0,1	0,3	0,1	0,3	2,1 (0,7-4,2)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,0</i>	<i>2,3</i>	<i>1,0</i>	<i>3,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Medicamentos para los vómitos	Sí	0,9	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	1,7 (0,6-4,2)
Receta: Medicamentos para los vómitos	Sí	0,9	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	1,0 (0,3-3,1)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,0</i>	<i>1,3</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,7</i>

En las niñas se mantiene la mayor parte de la descripción realizada para el caso de los niños. Los más consumidos son los medicamentos para el dolor y la fiebre (33%) y los del catarro, gripe, garganta y bronquios (30%). Siguen los antibióticos (11,4%), alergia (6,7%) y los reconstituyentes (5,1%).

Además se consumen más los medicamentos más recetados. También se repite la pauta de mayor consumo de medicamentos en la población gitana, pero se comparte el nivel de consumo sin receta observado en las niñas de la población general en líneas generales.

Tabla 16.1d. Listado de medicamentos consumidos y recetados. Comparación población EN-SE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo. Niñas.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.									
Pregunta: "durante las últimas 2 semanas ¿ha consumido el niño/a los siguientes medicamentos y le fueron recetados en algún momento por el médico?. No incluya medicamentos homeopáticos o naturales".									
"CONSUME" % QUE HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS PARA:		CLASE I	CLASE II	CLASE III	CLASE IVA	CLASE IVB	CLASE V	POBLACIÓN GENERAL	POBLACIÓN GITANA
"RECETA" % AL QUE LE HAN RECETADO MEDICAMENTOS PARA:		%	%	%	%	%	%	%	% (IC95%)
Consumo: Medicamentos para el catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	Sí	12,6	12,4	11,2	15,6	17,6	16,4	14,5	32,0 (26,6-38,5)
Receta: Medicamentos para el catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	Sí	9,6	6,2	9,0	11,1	14,3	12,3	10,7	25,6 (20,4-31,5)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,3</i>	<i>2,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>	<i>1,3</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>
Consumo: Medicamentos para el dolor y/o bajar fiebre	Sí	12,4	16,7	13,3	14,5	7,7	10,9	13,0	33,0 (27,4-39,4)
Receta: Medicamentos para el dolor y/o bajar fiebre	Sí	9,9	9,7	9,6	9,2	5,2	6,7	8,8	25,2 (20,0-31,0)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,3</i>	<i>1,7</i>	<i>1,4</i>	<i>1,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,3</i>
Consumo: Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	4,8	2,7	2,4	2,9	3,1	1,5	2,8	5,1 (2,7-8,4)
Receta: Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	3,8	1,5	1,4	2,4	2,3	1,3	2,0	4,7 (2,5-7,9)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,3</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,1</i>
Consumo: laxantes	Sí	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,2	1,9 (0,8-4,6)
Receta: laxantes	Sí	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,2	1,0 (0,1-2,7)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>1,1</i>	<i>1,8</i>
Consumo: Antibióticos	Sí	7,2	8,8	6,3	5,4	4,3	6,4	6,3	11,4 (7,7-15,9)
Receta: Antibióticos	Sí	7,2	8,5	6,2	5,0	4,3	6,4	6,1	11,6 (8,1-16,4)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	0,3	0,2	2,8 (1,3-5,7)
Receta: Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	0,3	0,2	3,0 (1,3-5,7)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>0,9</i>
Consumo: Medicamentos para la alergia	Sí	1,2	1,2	3,5	2,4	3,7	2,3	2,6	6,7 (4,0-10,5)
Receta: Medicamentos para la alergia	Sí	1,1	1,2	3,2	2,3	2,6	1,9	2,3	6,7 (4,0-10,5)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,4</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>
Consumo: Medicamentos para la diarrea	Sí	0,0	0,3	1,1	1,2	0,6	0,4	0,7	2,3 (1,0-5,2)
Receta: Medicamentos para la diarrea	Sí	0,0	0,3	1,1	1,0	0,6	0,4	0,7	1,7 (0,5-4,0)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,3</i>
Consumo: Medicamentos para los vómitos	Sí	0,8	0,6	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	4,0 (2,1-7,4)
Receta: Medicamentos para los vómitos	Sí	0,8	0,6	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	2,7 (1,0-5,2)
<i>Ratio consumo/receta</i>		<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>

16.3 Resumen de resultados

La población gitana comparte con la población general un importante problema de automedicación. En este sentido se ha de considerar que una razón (o *ratio*) de 1,2 entre medicamentos consumidos y recetados, como la que se encuentra en algunos grupos para el caso de los antibióticos, supone que cerca de un 20% de los antibióticos se está consumiendo sin receta.

A la población gitana se le recetan más medicamentos y consume más cantidad de medicamentos que la población general lo que refuerza la conclusión de la mayor morbilidad en esta población debido a su posición socioeconómica. No obstante este resultado también podría explicarse por un efecto combinado de automedicación y medicalización excesiva. Recuérdese que la pregunta incluida en el cuestionario hace referencia al consumo de medicamentos **en las dos últimas semanas**.

- El consumo de algunos medicamentos es más elevado en la población gitana que en la población general: por ejemplo, un 28% de los hombres gitanos y un 42,9% de las mujeres gitanas señala haber consumido medicamentos para el dolor y/o bajar la fiebre en las dos últimas semanas (frente al 14,7% y 24,9% en hombres y mujeres, respectivamente, de la población general).
- A la población gitana se le recetan más medicamentos que a la población general.
- La automedicación es un problema compartido por la población gitana y la población general, sobre todo en los medicamentos para el catarro, gripe, garganta y bronquios y los indicados para el dolor o bajar la fiebre.

16.4 Prioridades de intervención.

- Elaborar campañas educativas sobre el tratamiento de los catarros, gripes y problemas de garganta y bronquios, así como el dolor y la fiebre, con la colaboración del personal sanitario, insistiendo especialmente en los problemas de los antibióticos y los efectos adversos de los distintos medicamentos.
- Mejorar los sistemas de información sobre medicamentos como los tranquilizantes y también los sistemas de control en su administración y distribución para garantizar un acceso a los mismos cuando sea recomendable.

16.5 Prioridades de investigación.

Estudiar la relación en el consumo de medicamentos entre las ideas y conductas de la población gitana y los sistemas de comercialización, control y distribución de medicamentos y el encuentro médico para conocer las causas de los posibles problemas de automedicación, medicalización excesiva y adecuación y seguimiento del tratamiento.